



営農NEWS



台風 18 号襲来の備えと通過後の被害軽減対策

大型の台風 18 号が本県またはその周辺を通過の予想で、本県でも非常に強い風と降雨が予想されます。風雨に備えて、被害を抑制する手段を事前に確認し、台風の通過後は、状況に応じて必要な対策を実施してください。

1 事前の対策

- 1) 排水の悪い圃場や施設では、周囲や圃場内に明渠を掘り、排水用のポンプなどを準備しておきます。
- 2) パイプハウスなど施設は、ハウスバンドや被覆資材の取り付け金具などを点検し、強風等に備えてください。
- 3) 果樹園等でも、支柱やネットの強度を確認し、弱い部分は補強しておきます。

2 被害を受けた圃場の対策

- 1) 水田や露地圃場または施設内が浸冠水した場合は、排水溝や畦畔を切るなどして速やかな排水対策を行います。
- 2) 作物の泥は洗い落とし、傷んだ茎葉や果実は取り除き、倒伏した株は引き起こして固定するなど、損傷の回復に努めてください。また、果樹等では樹の損傷部分を剪除し、切り口に塗布剤などを塗って保護します。
- 3) 土壌の乾き具合や作物の草勢を観察しながら、液肥の葉面散布や追肥後に中耕、培土などを行ってください。
- 4) 果樹では、樹の損傷部分や折損して剪定した切り口を、塗布剤で保護します。
- 5) 暴風雨にさらされた作物は、病害が発生しやすくなりますので、殺菌剤などの予防散布に努めてください。

3 病害の予防対策（農薬登録は平成 29 年 9 月 14 日現在です）

- 1) ナス：褐色腐敗病 … ランマンフロアブル 2,000 倍（前日まで／4 回以内）、プロポーズ顆粒水和剤 1,000 倍（前日まで／4 回以内）
すすかび病 … ダコニール 1000 1000 倍（前日まで／4 回以内）、ベルコートフロアブル 2,000 倍（前日まで／3 回以内）
- 2) ネギ：軟腐病 … スターナ水和剤 2,000 倍（7 日前まで／3 回以内）、カスミンボルドー 1,000 倍（14 日前まで／2 回以内）
- 3) ショウガ：根茎腐敗病 … ユニフォーム粒剤 18 kg／10a 土壌表面散布（30 日前まで／3 回以内）、オラクル顆粒水和剤 2,000 倍
1ℓ／㎡土壌灌注（3 日前まで／3 回以内）、紋枯病 … バリダシン液剤 5 800 倍（14 日前まで／4 回以内）
- 4) キャベツ：黒腐病・黒斑細菌病 … カセット水和剤 1,000 倍（7 日前まで／3 回以内）、Zボルドー 500 倍（—／—）
カスミンボルドー 1,000 倍（7 日前まで／4 回以内）、
株腐病 … ソータルWDG 1,000 倍（7 日前まで／3 回以内）、バリダシン液剤 5 800 倍（7 日前まで／5 回以内）
- 5) ブロッコリー：黒腐病 … カセット水和剤 1,000 倍（21 日前まで／2 回以内）、カスミンボルドー 1,000 倍（21 日前まで／4 回以内）
Zボルドー 500 倍（—／—）
- 6) レタス：斑点細菌病・腐敗病…カスミンボルドー 1,000 倍（7 日前まで／4 回以内）、カセット水和剤 1,000 倍（7 日前まで／2 回以内）
菌核病 … スミレックス水和剤 1,000～2,000 倍（7 日前まで／5 回以内）、アフエットフロアブル 2,000 倍（前日まで／3 回以内）
すそ枯病 … ダコニール 1000 1000 倍（14 日前まで／3 回以内）、バリダシン液剤 5 800 倍（7 日前まで／3 回以内）
- 7) 非結球レタス：腐敗病 … カスミンボルドー 1,000 倍（21 日前まで／4 回以内）、バリダシン液剤 5 800 倍（7 日前まで／3 回以内）
- 8) ハクサイ：黒斑細菌病・軟腐病 … カセット水和剤 1,000 倍（21 日前まで／2 回以内）、
スターナ水和剤 1,000 倍（7 日前まで／3 回以内）、バリダシン液剤 5 500 倍（3 日前まで／3 回以内）
べと病・白斑病…ダコニール 1000 1000 倍（7 日前まで／2 回以内）、ペンコゼブ水和剤 600 倍（30 日前まで／1 回）
- 9) ダイコン：軟腐病・黒斑細菌病 … カスミンボルドー 1,000 倍（14 日前まで／3 回以内）、Zボルドー 500 倍（—／—）
- 10) その他の野菜類：軟腐病・黒腐病・斑点細菌病・べと病 … Zボルドー 500 倍（—／—）
- 11) ダイズ：葉焼病、べと病、茎疫病 … フェスティバルC水和剤 600 倍（7 日前まで／3 回以内）、茎疫病・べと病 … ランマンフロアブル 1,000～2,000 倍（7 日前まで／3 回以内）、プロポーズ顆粒水和剤 1,000 倍（21 日前まで／2 回以内）
- 12) 果樹（ナシ、ブドウ、カキ、リンゴなど）：参考防除例を参照して、予防に努めてください。

4 生育回復の対策（葉面散布剤の使用法）

<葉菜類や根菜類>

- 1) メリット青 300～500 倍＋グリーンセーフS 1,000 倍を、3～5 日おきに 2 回程度の葉面散布を行います。 または
- 2) ファイトオーツー 1,000 倍＋ファイトマジック 1,000 倍を、5～7 日おきに 2～3 回の葉面散布を行います。

<果菜類>

- 1) メリット青またはメリット黄 300～500 倍＋グリーンセーフS 1,000 倍を、3～5 日おきに 2 回程度の葉面散布を行います。
※ 青・黄は生育に応じて使い分けてください。

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

※ JA 全農いばらきホームページでもご覧になれます。



生産資材部 営農企画課

電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040