



営農NEWS



農作物への降雹等による被害軽減対策について

9 月 25 日夜、県内一部でゲリラ的に降雨と降雹がありました。これにより、ハウスや果樹、露地野菜などで一部被害が発生しています。現在のところ、被害は地域によりさまざまですが、果樹および露地野菜等において被害を受けた場合は、その被害程度に応じて適切な対応を行ってください。なお、被害が比較的軽い場合でも、今後、生育への影響、病害の発生などが懸念されますので、下記を参考に必要に応じて事前の対策に努めてください。

1 被害を受けた圃場の対策

- 1) 水田や露地圃場または施設内が浸水及び冠水した場合は、速やかな排水対策を行ってください。
- 2) 作物に付着した泥はできるだけ落とし、損傷した茎葉は可能な限り取り除きましょう。
- 3) 土壌の乾き具合や作物の草勢を観察しながら、液肥の葉面散布や追肥後に中耕、培土などを行いましょう。
- 4) 露地野菜などが風にあおられたり、大雨にたたかれたりすると病害発生の原因になりますので、状況を見ながら殺菌剤などの予防散布に努めましょう。

2 病害の予防対策（農薬登録は 9 月 26 日現在）

- 1) レタス：斑点細菌病・腐敗病…カスミンボルドー 1,000 倍（7 日前まで／4 回以内）、カセット水和剤 1,000 倍（7 日前まで／2 回以内）
 菌核病 … スミレックス水和剤 1,000～2,000 倍（7 日前まで／5 回以内）、アフエットフロアブル 2,000 倍（前日まで／3 回以内）
 すそ枯病 … ダコニール 1000 1000 倍（14 日前まで／3 回以内）、バリダシン液剤 5 800 倍（7 日前まで／3 回以内）
- 2) 非結球レタス：腐敗病 … カスミンボルドー 1,000 倍（21 日前まで／4 回以内）、バリダシン液剤 5 800 倍（7 日前まで／3 回以内）
- 3) ハクサイ：黒斑細菌病・軟腐病 … カセット水和剤 1,000 倍（21 日前まで／2 回以内）、
 スターナ水和剤 1,000 倍（7 日前まで／3 回以内）、バリダシン液剤 5 500 倍（3 日前まで／3 回以内）
 べと病・白斑病…ダコニール 1000 1000 倍（7 日前まで／2 回以内）、ペンコゼブ水和剤 600 倍（30 日前まで／1 回以内）
- 4) キャベツ：黒腐病・黒斑細菌病 … カセット水和剤 1,000 倍（7 日前まで／3 回以内）、Z ボルドー 500 倍（－／－）
 カスミンボルドー 1,000 倍（7 日前まで／4 回以内）、
 株腐病 … ソータルWDG 1,000 倍（7 日前まで／3 回以内）、バリダシン液剤 5 800 倍（7 日前まで／5 回以内）
- 5) ブロッコリー：黒腐病 …カセット水和剤 1,000 倍（21 日前まで／2 回以内）、カスミンボルドー 1,000 倍（21 日前まで／4 回以内）
 Z ボルドー 500 倍（－／－）
- 6) ナス：褐色腐敗病 … ランマンフロアブル 2,000 倍（前日まで／4 回以内）、
 プロポーズ顆粒水和剤 1,000 倍（前日まで／4 回以内）
 すすかび病 … ダコニール 1000 1000 倍（前日まで／4 回以内）、ベルコートフロアブル 2,000 倍（前日まで／3 回以内）
- 7) ネギ：軟腐病 … スターナ水和剤 2,000 倍（7 日前まで／3 回以内）、カスミンボルドー 1,000 倍（14 日前まで／2 回以内）
 黒斑病・べと病 … ダコニール 1000 1,000 倍（14 日前まで／3 回以内）
- 8) ダイコン：軟腐病・黒斑細菌病 … カスミンボルドー 1,000 倍（14 日前まで／3 回以内）、
 カセット水和剤 1,000 倍（14 日前まで／3 回以内）、Z ボルドー 500 倍（－／－）
- 9) その他の野菜類：軟腐病・黒腐病・斑点細菌病・べと病 … Z ボルドー 500 倍（－／－）
- 10) ダイズ：葉焼病、べと病、茎疫病 … フェスティバルC水和剤 600 倍（7 日前まで／3 回以内）、茎疫病・べと病 … ランマンフロアブル 1,000～2,000 倍（7 日前まで／3 回以内）、プロポーズ顆粒水和剤 1,000 倍（21 日前まで／2 回以内）
- 11) 果樹（ナシ、ブドウ、カキ、リンゴなど）：参考防除例を参照して、予防に努めてください。

3 生育回復の対策（葉面散布剤の使用法）

<葉菜類や根菜類>

- 1) メリット青 300～500 倍＋グリーンセーフ S 1,000 倍を、3～5 日おきに 2 回程度の葉面散布を行います。 または
- 2) ファイトオーツー 1,000 倍＋ファイトマジック 1,000 倍を、5～7 日おきに 2～3 回の葉面散布を行います。

<果菜類>

- 1) メリット青またはメリット黄 300～500 倍＋グリーンセーフ S 1,000 倍を、3～5 日おきに 2 回程度の葉面散布を行います。

※ 青・黄は生育に応じて使い分けてください。

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

※ JA 全農いばらきホームページでもご覧になれます。



生産資材部 営農企画課

電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040