



営農NEWS



ラッキョウ、タマネギ、ニンニク栽培での病害発生に注意しましょう

この冬は寒さが厳しく、越冬したラッキョウ、タマネギ、ニンニクは凍霜害を受けています。今後、気温上昇に伴い、生育伸長や肥大しますが、天候不順のときには病害が発生しやすくなるので、曇雨天が続くような予報では事前の予防、病害の早期発見、早期防除に努めてください。これらユリ科作物で、これから発生しやすい主な病害は、細菌による軟腐病やタマネギ腐敗病、ニンニク春腐病など、カビによるべと病や白色疫病、さび病、ボトリチス菌による葉枯症、灰色かび病などがあります。

なお、**薬剤の散布に際しては、各作物の収穫前日数に注意し、株元や葉全体に丁寧に散布することが重要です。**

表 1 ラッキョウ各種病害の主な防除薬剤 (平成 30 年 3 月 8 日現在)

病 害 名				薬 剤 名	希釈倍数	使用時期 / 使用回数	分類
白色疫病	灰色かび病	さび病	軟腐病				
○				フロンサイド水和剤	1,000 倍 2,000 倍	収穫 14 日前まで / 5 回以内	29
○	○			フォリオゴールド	1,000 倍	収穫 14 日前まで / 3 回以内	4 と M5
○				ホライズンドライフロアブル	1,000 倍	収穫 21 日前まで / 3 回以内	11 と 27
○				ランマンフロアブル	2,000 倍	収穫 3 日前まで / 4 回以内	21
	○			ダコニール 1000	1,000 倍	収穫 14 日前まで / 3 回以内	M5
	○			カンタスドライフロアブル	1,500 倍	収穫前日まで / 3 回以内	7
		○		アミスター 20 フロアブル	2,000 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内	11
			○	スターナ水和剤	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内	31
			○	Zボルドー	500 倍	- / -	M1

注 1) 分類欄には、FRAC コードを記載しました (コードが 2 つは 2 成分)。同一分類 (コード) は作用点が同じなので、連用は避けてください。

表 2 タマネギ各種病害の主な防除薬剤 (平成 30 年 3 月 8 日現在)

病 害 名					薬 剤 名	希釈倍数	使用時期 / 使用回数	分類
べと病	白色疫病	灰色かび病	灰色腐敗病	軟腐病				
○		○	○		ジマンダイセン水和剤	400~600 倍 400~500 倍	収穫 3 日前まで / 5 回以内	M3
	○				フロンサイド水和剤	1,000~2,000 倍 1,000 倍	収穫 7 日前まで / 5 回以内	29
○	○	○			ダコニール 1000	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 6 回以内	M5
○	○				ランマンフロアブル	2,000 倍	収穫 7 日前まで / 4 回以内	21
○	○				リドミルゴールド MZ	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内	4 と M3
○	○				ホライズンドライフロアブル	2,500 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内	11 と 27
○	○				レーバスフロアブル	2,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	40
		○	○		ベルコートフロアブル	1,000 倍	収穫前日まで / 5 回以内	M7
		○			セイビアーフロアブル 20	1,000~1,500 倍 1,500 倍	収穫前日まで / 3 回以内	12
		○	○		カンタスドライフロアブル	1,000~1,500 倍	収穫前日まで / 3 回以内	7
				○	スターナ水和剤	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 5 回以内	31
				○	カスミンボルドー	1,000 倍	収穫 14 日前まで / 5 回以内	24 と M1
○				○	Zボルドー	500 倍	- / -	M1

表 3 ニンニク各種病害の主な防除薬剤 (平成 30 年 3 月 8 日現在)

病 害 名					薬 剤 名	希釈倍数	使用時期 / 使用回数	分類
葉枯病	黄斑病	さび病	白斑葉枯病	春腐病				
○	○	○	○		ダコニール 1000	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 6 回以内	M5
○	○				ポリベリン水和剤	1,000~1,500 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内	19 と M7
○	○	○	○		オンリーワンフロアブル	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内	3
○	○	○	○		シグナムWDG	1,500 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内	7 と 11
○		○			アミスター 20 フロアブル	2,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内	11
				○	バリダシン液剤 5	800 倍	収穫 7 日前まで / 5 回以内	U18
				○	カスミンボルドー	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 5 回以内	24 と M1
		○	○	○	Zボルドー	500 倍	- / -	M1

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

※ JA 全農いばらきホームページでもご覧になれます。



生産資材部 営農企画課

電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040