



営農NEWS



水稻の斑点米カメムシ類の防除を徹底しましょう 「病害虫発生予察注意報」が発表されました

県病害虫防除所の調査によりますと、7月下旬現在、水田内における斑点米カメムシのすくい取り虫数は平年より多く、そのうちクモヘリカメムシおよびイネカメムシは平年よりやや多い、また、アカスジカスミカメは平年より多い状況で、気象予報の向こう1カ月の気温が平年より高いと予想され、カメムシ類の発生を助長する条件であることから、

平成 30 年 7 月 31 日付で「病害虫発生予察注意報 第 2 号」

斑点米カメムシの発生が多くなっています！

～斑点米の発生防止には乳熟期の防除が重要です～ を発表しました

防除適期に斑点米カメムシ類の防除を必ず実施してください。

なお、カメムシ類の生息を確認する場合は、日中の高温期は避けて、夕方や早朝など涼しい時間帯に水稻の穂や株元などを観察してください。卵からふ化した幼虫は非常に小さいため、発生を確認するためには、注意深く探してください。

<薬剤防除のポイント>

1. 斑点米カメムシの幼虫を対象とした場合、防除適期は出穂 10～15 日後頃です。斑点米を抑制するためには、とくにこの新幼虫を対象とした防除が最も重要です。

その後はカメムシ類の発生状況を観察しながら、必要に応じて追加防除を行いましょう。

2. すでに空中防除などを実施した水田であっても、その後に新成虫が再飛来したりするので、発生を認めた場合は追加防除を実施してください。
3. 出穂期に成虫を確認していた水田では、特に注意が必要です。
4. 収穫の遅い水田では、8 月中旬以降に新成虫が周辺から飛来して、集中的に被害を受ける場合がありますので、十分注意が必要です。
5. 防除を行う際には、収穫前日数などの農薬使用基準に十分に注意してください。特に、周辺に早生品種が作付されている場合は、農薬の飛散に十分注意が必要です。
また、ミツバチへの被害を軽減するために、ミツバチの活動が最も盛んな時間帯（午前 8 時～12 時まで）の農薬散布は避けてください。

表 1 水稻 カメムシ類の主な防除薬剤（平成 30 年 8 月 1 日現在）

薬 剤 名	希 釈 倍 数	使用時期 / 使用回数	分類
MR. ジョーカー EW	2,000 倍	収穫 14 日前まで / 2 回以内	3A
MR. ジョーカー粉剤 DL	3～4 kg	収穫 7 日前まで / 2 回以内	
スタークル顆粒水溶剤	2,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内	4A
スタークル粉剤 DL	3 kg	収穫 7 日前まで / 3 回以内	
キラップフロアブル	1,000～2,000 倍	収穫 14 日前まで / 2 回以内	2B
キラップ粉剤 DL	3～4 kg	収穫 14 日前まで / 2 回以内	

- 注) 1. 各薬剤の液剤または粉剤の、どちらかを使用してください。
2. 専用の少量散布用ノズルを装着した乗用型の地上液剤散布機器を用いる場合や、無人ヘリコプターを使用する場合には、それぞれの農薬使用基準を遵守して使用してください。
3. 分類欄には、IRAC コードを記載しました。同一分類（コード）は作用点が同じなので、連用は避けてください。

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

※JA全農いばらきホームページでもご覧になれます。



JA全農いばらき

生産資材部 営農企画課

電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040