



営農NEWS



ダイズ病害虫の防除を徹底しましょう

ダイズの生育中には、種々の病害虫が発生します。特に、莢や子実被害を生じる病害虫の発生は、ダイズの収量や品質の低下を招いて大きな減収となります。

主な莢害虫としてはダイズサヤタマバエ、マメシクイガ、シロイチモジマダラメイガ、サヤムシガ類などがあり、さらに子実を吸汁加害するカメムシ類がいます。また、茎葉害虫として生育初～中期に若葉を食害するサヤムシガ類、中～後期に多発生すると葉を暴食して丸坊主にするハスモンヨトウ、オオタバコガ、マメハンミョウなどがいます。

病害虫発生予報 8 月号（県病害虫防除所）によると、8 月におけるダイズ害虫のカメムシ類およびチョウ目幼虫の発生は平年並と予想していますが、今後の天候次第によっては被害発生に十分注意し、常に圃場での観察が必要です。

また、子実被害としては紫斑病があり、開花期以降から成熟期までに連続した降雨があると発生が多くなりますので、その場合は防除が必要です。

これらの病害虫は、主にダイズの開花期から子実肥大期にかけて被害が伸展しますので、この期間における防除の徹底が特に重要となります。8～9 月にかけてダイズ圃場の病害虫をよく観察し、適期、適切な防除に努めてください。

<防除のポイント>

- 1 ダイズの開花は、播種時期や品種によって異なります。6 月下旬の播種では、平年、タチナガハやハタユタカで 8 月上旬頃に、納豆小粒で 8 月中旬頃に開花します。防除時期の簡易な目安にするのは、開花してからの経過日数ですので、圃場のダイズをよく観察し、基準となる開花した日を記録して防除時期の参考とします。
- 2 ダイズ害虫は種類が多く、加害時期や防除適期が複雑で微妙に異なります。そこで薬剤防除時期の目安として、開花後 10～15 日頃より約 10 日～2 週間間隔で 3～4 回行う必要があります。前半はサヤタマバエや莢内子実を食害するシロイチモジマダラメイガ等が中心で、中～後半はカメムシ類や食葉性のハスモンヨトウ、オオタバコガが中心となります。なお、カメムシ類やハスモンヨトウ等が多発生した場合は、適宜、追加防除が必要になります。
- 3 紫斑病は、開花後 15～40 日間に 1～2 回の薬剤散布を行い、その後も降雨が続く場合には追加防除を実施します。
- 4 ハスモンヨトウやオオタバコガ幼虫は老齢になると薬剤の防除効果が低下するため、圃場をよく観察し、若齢期のうちに防除を行ってください。なお、その際は葉裏や株元にも十分薬液がかかるように散布してください。
- 5 薬剤防除の際は、薬剤の収穫前日数に十分注意し、また、同一分類（コード）剤の連続散布は避けてください。

第 1 表 ダイズ主要害虫の主な防除薬剤（令和元年 8 月 5 日現在）

薬剤名	希釈倍率または使用量	収穫前日数／使用回数	対象害虫					分類
			ハスモンヨトウ	シロイチモジマダラメイガ	マメシクイガ	ダイズサヤタマバエ	カメムシ類	
スミチオン乳剤	1,000 倍 1,000～1,500 倍	収穫 21 日前まで／4 回以内		○		○	○	1B
トレボン乳剤	1,000 倍	収穫 14 日前まで／2 回以内	○	○	○	○	○	3A
トレボン粉剤 DL	4kg/10a	収穫 14 日前まで／2 回以内	○	○	○	○	○	3A
スタークル顆粒水溶剤	2,000 倍	収穫 7 日前まで／2 回以内				○	○	4A
プレオフロアブル	1,000～2,000 倍	収穫 7 日前まで／2 回以内	○		○			un
プレバソンフロアブル 5	4,000 倍	収穫 7 日前まで／2 回以内	○		○			28
アニキ乳剤	2,000～3,000 倍	収穫前日まで／3 回以内	○					6
アタブロン乳剤	2,000～4,000 倍	収穫 14 日前まで／2 回以内	○					15
クラブフロアブル	2,000 倍	収穫 7 日前まで／2 回以内					○	2B
MR. ジョーカー粉剤 DL	4kg/10a	収穫 7 日前まで／2 回以内					○	3A

注 1) 無人航空機または少量散布専用ノズルを装着した乗用型散布機を用いる場合は、それぞれの農薬使用基準を遵守して使用してください。

注 2) 分類欄には、IRAC コードを記載しました。同一分類（コード）は作用点が同じなので、連用は避けてください。

第 2 表 ダイズ紫斑病の主な防除薬剤（令和元年 8 月 5 日現在）

薬剤名	希釈倍率又は使用量	使用時期 / 使用回数	分類
アミスター 20 フロアブル	2,000～3,000 倍	収穫 7 日前まで / 2 回以内	11
ファンタジスタ 顆粒水和剤	2,000～4,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内	11
ゲッター 水和剤	1,000 倍	収穫 14 日前まで / 3 回以内	1 と 10
ベルコート 水和剤	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 4 回以内	M7
Z ボルドー	500 倍	- / -	M1

注 1) 分類欄には、FRAC コードを記載しました。同一分類（コード）は作用点が同じなので、連用は避けてください。

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

※ JA 全農いばらきホームページでもご覧になれます。



生産資材部 営農企画課

電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040