



営農NEWS



台風15号の通過後の被害軽減対策

非常に強い台風15号が茨城県を縦断し、9日早朝に強風と降雨がありました。現在のところ、被害は地域や作物によりさまざまですが、被害を受けた程度に応じて適切な対応を行ってください。なお、被害が比較的軽い場合でも、今後、生育への影響、病害の発生などが懸念されますので、下記を参考に必要に応じて事前の対策に努めてください。

1 被害を受けた圃場の対策

- 1) 水田や露地圃場または施設内が浸冠水した場合は、明渠や畦畔を切るなどして速やかな排水対策を行ってください。
- 2) 作物に付着した泥は洗い落とし、傷んだ茎葉は可能な限り取り除いて、損傷の回復に努めましょう。
- 3) 露地ナスは、倒伏した株を引き起こした後、株元への土寄せや支柱で固定します。キズ果、変形果は除去し、株間の通気性、土壌の過湿を改善して、樹勢を回復させるため収穫を少し早めに行います。
- 4) 土壌の乾き具合や作物の草勢を観察しながら、液肥の葉面散布や追肥後に中耕、培土などを行ってください。
- 5) 果樹では樹の損傷部分を剪定し、切り口を塗布剤で保護します。
- 6) 強風や大雨にたたかれた作物は病害が発生しやすいため、状況に応じて殺菌剤などの予防散布に努めてください。

2 病害の予防対策

1) 作物の病害対策として、使用薬剤の収穫前日数および総使用回数に十分注意して、防除に努めてください。

作物名	主な防除薬剤	(令和元年9月10日現在)
ナス	○褐色腐敗病 … ランマンフロアブル 2,000倍 (前日まで/4回以内) [21] またはプロポーズ顆粒水和剤 1,000倍 (前日まで/4回以内) [40とM5] ○灰色かび病 … ゲッター水和剤 1,000~1,500倍 (前日まで/5回以内) [1と10] またはベルコートフロアブル 2,000倍 (前日まで/3回以内) [M7]	
ネギ	○軟腐病 … スターナ水和剤 2,000倍 (7日前まで/3回以内) [31] またはカスミンボルドー 1,000倍 (14日前まで/2回以内) [24とM1] またはバリダシン液剤 500倍 (21日前まで/1回) [U18] ○葉枯病・黒斑病・べと病 … ダコニール1000 1,000倍 (14日前まで/3回以内) [M5]	
ショウガ	○根茎腐敗病 … オラクル顆粒水和剤 2,000倍 1~30/m ² 土壌灌注 (3日前まで/3回以内) [21] ○紋枯病 … バリダシン液剤 5800倍 (14日前まで/4回以内) [U18]	
キャベツ	○黒腐病・黒斑細菌病 … カセット水和剤 1,000倍 (7日前まで/3回以内) [24と31] またはカスミンボルドー 1,000倍 (7日前まで/4回以内) [24とM1] またはZボルドー 500倍 (—/—) [M1] ○株腐病 … バリダシン液剤 5800倍 (7日前まで/5回以内) [U18]	
ブロッコリー	○黒腐病 … カセット水和剤 1,000倍 (21日前まで/2回以内) [24と31] またはカスミンボルドー 1,000倍 (21日前まで/4回以内) [24とM1] またはZボルドー 500倍 (—/—) [M1]	
レタス	○斑点細菌病・腐敗病 … カセット水和剤 1,000倍 (7日前まで/2回以内) [24と31] またはカスミンボルドー 1,000倍 (7日前まで/4回以内) [24とM1] ○菌核病 … スミレックス水和剤 1,000~2,000倍 (7日前まで/5回以内) [2] またはアフェットフロアブル 2,000倍 (前日まで/3回以内) [7] ○すそ枯病 … ダコニール1000 1,000倍 (14日前まで/3回以内) [M5] またはバリダシン液剤 5800倍 (7日前まで/3回以内) [U18]	
非結球レタス	○腐敗病 … カスミンボルドー 1,000倍 (21日前まで/4回以内) [24とM1] またはバリダシン液剤 5800倍 (7日前まで/3回以内) [U18]	
ハクサイ	○黒斑細菌病・軟腐病 … カセット水和剤 1,000倍 (21日前まで/2回以内) [24と31] またはスターナ水和剤 1,000倍 (7日前まで/3回以内) [31] またはバリダシン液剤 500倍 (3日前まで/3回以内) [U18] ○べと病・白斑病 … ダコニール1000 1000倍 (7日前まで/2回以内) [M5] またはペンコゼブ水和剤 600倍 (30日前まで/1回) [M3]	
ダイコン	○軟腐病・黒斑細菌病 … カスミンボルドー 1,000倍 (14日前まで/3回以内) [24とM1] またはZボルドー 500倍 (—/—) [M1]	
その他の野菜類	○軟腐病・黒腐病・斑点細菌病・べと病 … Zボルドー 500倍 (—/—) [M1]	
ダイズ	○茎疫病・べと病 … ランマンフロアブル 1,000~2,000倍 (7日前まで/3回以内) [21] またはプロポーズ顆粒水和剤 1,000倍 (21日前まで/2回以内) [40とM5]	
果樹 (ナシ、ブドウ、カキ、リンゴなど)	病虫害参考防除例を参照して、予防に努める	

3 作物生育の回復対策 (葉面散布剤の使用法)

<葉菜類や根菜類>

- 1) メリット青 300~500倍 + グリーンセーフS 1,000倍を、3~5日おきに2回程度の葉面散布を行います。 または
- 2) ファイトオーツ-1,000倍 + ファイトマジック 1,000倍を、5~7日おきに2~3回の葉面散布を行います。

<果菜類>

- 1) メリット青またはメリット黄 300~500倍 + グリーンセーフS 1,000倍を、3~5日おきに2回程度の葉面散布を行います。 ※ 青・黄は生育に応じて使い分けてください。

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

※ JA全農いばらきホームページでもご覧になれます。



生産資材部 営農企画課

電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040