



# 営農NEWS



## 夏まきニンジンの主な病害虫防除

夏まきニンジン栽培は、主に7月下旬～8月中旬頃に播種し、秋冬季に収穫する作型ですが、圃場によっては、ネコブセンチュウなどによる根部被害の発生が常に懸念されますので、事前に殺センチュウ剤などを利用した土壌消毒や抗植物栽培の導入などが必要になります。

茎葉に発生する病害虫として、主に9～10月にかけて黒葉枯病やうどんこ病、軟腐病など、また、アブラムシ類、キアゲハ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウや「シャクトリムシ」などの病害虫が発生し、生育あるいは根部肥大の不良などで、大きな減収を招くことがあります。

黒葉枯病は、ほぼ例年発生がみられますが、特に、晴天と曇雨天が繰り返す年には発病、被害が激しくなる傾向があり、また、軟腐病は、管理作業等での株の傷口や害虫の食害痕などから病原菌が侵入しますので、降雨が続く場合や台風の時などには防除が必要になります。

アブラムシ類は、秋季が温暖に経過したときに寄生が多くなり、新芽や芯葉に寄生すると展開葉の奇形や萎縮をおこします。また、各種のウイルスを媒介するため、発病すると商品価値が低下しますので、十分な注意が必要です。キアゲハなどチョウ目害虫も、食害が激しいと生育や根部肥大の不良を招き、甚だしい場合は商品価値が無くなります。

これら病害虫の発生に十分注意し、早期の発見と適切な薬剤防除に心がけてください。

### 【防除のポイント】

- 1 黒葉枯病は、密植や軟弱徒長、肥切れ等のときに発生を助長しますので、肥培管理に注意が必要です。
- 2 アブラムシ類やウイルス病の防除として、アブラムシ類の飛来源、ウイルスの保毒源となる圃場周辺の雑草を常に適切に除草し、圃場衛生に努めます。
- 3 キアゲハ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウなどチョウ目害虫は、幼虫の発生や被害を認めたら早めに防除します。
- 4 薬剤防除に際しては下記を参考に、耐性菌や抵抗性害虫の出現を回避するため、ローテーション防除しましょう。

表1 ニンジン主要病害の主な防除薬剤 (令和元年9月17日現在)

| 薬剤名          | 黒葉枯病 | うどんこ病 | 軟腐病 | 希釈倍率             | 使用時期 / 使用回数     | 分類    |
|--------------|------|-------|-----|------------------|-----------------|-------|
| ファンタジスタ顆粒水和剤 | ○    | ○     |     | 3,000倍           | 収穫3日前まで / 3回以内  | 11    |
| ベルコートフロアブル   | ○    | ○     |     | 1,000倍           | 収穫14日前まで / 5回以内 | M7    |
| ダコニール1000    | ○    |       |     | 1,000倍           | 収穫7日前まで / 5回以内  | M5    |
| シグナムWDG      | ○    | ○     |     | 2,000倍           | 収穫14日前まで / 2回以内 | 7と11  |
| ロブラール水和剤     | ○    |       |     | 1,000～1,500倍     | 収穫14日前まで / 4回以内 | 2     |
| アフェットフロアブル   | ○    |       |     | 2,000倍           | 収穫7日前まで / 3回以内  | 7     |
| カスミンボルドー     | ○    |       | ○   | 1,000倍           | 収穫14日前まで / 2回以内 | 24とM1 |
| アリエッティ水和剤    | ○    |       |     | 800倍             | 収穫7日前まで / 3回以内  | P7    |
| トリフミン水和剤     |      | ○     |     | 3,000倍           | 収穫前日まで / 3回以内   | 3     |
| スターナ水和剤      |      |       | ○   | 1,000倍           | 収穫7日前まで / 3回以内  | 31    |
| Zボルドー        | ○    |       | ○   | 500～800倍<br>500倍 | — / —           | M1    |

注) 表1の分類欄にはFRACコード、表2にはIRACコードを記載しました。同一分類(コード)は作用点が同じなので、連用は避けてください。

表2 ニンジン主要害虫の主な防除薬剤 (令和元年9月17日現在)

| 薬剤名         | アブラムシ類 | キアゲハ | ヨトウムシ | ハスモンヨトウ | 希釈倍率         | 使用時期 / 使用回数     | 分類  |
|-------------|--------|------|-------|---------|--------------|-----------------|-----|
| モスピラン顆粒水溶剤  | ○      | ○    |       |         | 4,000倍       | 収穫前日まで / 3回以内   | 4A  |
| マラソン乳剤      | ○      | ○    |       |         | 2,000～3,000倍 | 収穫14日前まで / 4回以内 | 1B  |
| コテツフロアブル    |        | ○    | ○     |         | 2,000倍       | 収穫前日まで / 2回以内   | 13  |
| アグロスリン乳剤    |        |      | ○     |         | 2,000倍       | 収穫7日前まで / 2回以内  | 3A  |
| カスケード乳剤     |        |      | ○     |         | 4,000倍       | 収穫3日前まで / 2回以内  | 15  |
| フェニックス顆粒水和剤 |        |      | ○     |         | 2,000～4,000倍 | 収穫前日まで / 2回以内   | 28  |
| アクセルフロアブル   |        |      |       | ○       | 1,000倍       | 収穫前日まで / 3回以内   | 22B |
| プレオフロアブル    |        |      |       | ○       | 1,000倍       | 収穫前日まで / 2回以内   | un  |

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

※JA全農いばらきホームページでもご覧になれます。



生産資材部 営農企画課

電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040