



# 営農NEWS



## 低気圧による暴風雨が通過後の被害軽減対策

4月13日に強い低気圧が茨城県沖を通過し、長い時間にかけて強風と降雨がありました。現在のところ、被害は地域や作物によりさまざまですが、被害を受けた程度に応じて適切な対応を行ってください。なお、被害が比較的軽い場合でも、今後、生育への影響、病害の発生などが懸念されますので、下記を参考に必要に応じて事前の対策に努めてください。

### 1 果樹：露地赤ナシ、ブドウ（巨峰）、リンゴなど

樹体に損傷を受けた場合は、その程度に応じて修復や損傷部への塗布剤による保護などを行い、生育の回復に努めます。枝葉の損傷部から病気が発生しやすいので、各果樹の茨城県病害虫参考防除例に基づき、確実に薬剤防除を実施します。なお、年次により春先に突発的に発生するナシ疫病にも注意が必要で、発生を確認したら防除を行います。

### 2 麦類

冠水した圃場は、速やかな排水に努めます。圃場の排水後、赤かび病など病害防除を実施します。なお、赤かび病の防除薬剤は 営農NEWS 第2770号（令和2年3月25日発行）を参照してください。

### 3 施設野菜

ビニールの破損等で、ハウス中の作物に被害が生じて、栽培継続が可能と思われる場合は、破損部を修復し、必要に応じて、病害虫の発生を抑制するための薬剤散布を行い、さらに葉面散布剤や追肥による生育の回復を図ってください。

### 4 露地野菜

強風や大雨でたたかれた作物は病害が発生しやすいため、状況に応じて殺菌剤などの予防散布に努めてください。なお、各作物の病害防除では、使用薬剤の収穫前日数および総使用回数に十分注意して実施します。

また、土壌の乾き具合や作物の草勢を観察しながら、液肥の葉面散布や追肥後に中耕、培土などを行ってください。

作物名	主な防除薬剤 (令和2年4月14日現在)
キャベツ	軟腐病 … カセット水和剤 1,000 倍 (7日前まで/3回以内) [24 と 31] またはバリダシン液剤 5 800 倍 (7日前まで/5回以内) [U18] 菌核病 … トップジンM水和剤 1,000~1,500 倍 (3日前まで/2回以内) [1] またはファンタジスタ顆粒水和剤 2,000~3,000 倍 (3日前まで/3回以内) [11]
ハクサイ	軟腐病 … バリダシン液剤 5 500 倍 (3日前まで/3回以内) [U18] またはスターナ水和剤 1,000 倍 (7日前まで/3回以内) [31] 菌核病 … トップジンM水和剤 1,500~2,000 倍 (7日前まで/2回以内) [1]
レタスおよび非結球レタス	腐敗病 … バリダシン液剤 5 800 倍 (7日前まで/3回以内) [U18] またはジーファイン水和剤 1,000 倍 (前日まで/ー) [NG と M1] 菌核病・灰色かび病 … アフェットフロアブル 2,000 倍 (前日まで/3回以内) [7]
ネギ	軟腐病 … スターナ水和剤 2,000 倍 (7日前まで/3回以内) [31] またはカスミンボルドー 1,000 倍 (14日前まで/2回以内) [24 と M1] またはバリダシン液剤 5 500 倍 (21日前まで/1回) [U18] べと病 … ランマンフロアブル 2,000 倍 (3日前まで/4回以内) [21]
タマネギ	べと病 … ペンコゼブ (ジマンダイセン) 水和剤 400~600 倍 (3日前まで/5回以内) [M3] またはホライズンドライフロアブル 2,500 倍 (3日前まで/3回以内) [11 と 27] 軟腐病 … バリダシン液剤 5 500 倍 (3日前まで/5回以内) [U18] またはスターナ水和剤 1,000 倍 (7日前まで/5回以内) [31]
ニラ	さび病・白斑葉枯病 … ストロビーフロアブル 3,000 倍 (前日まで/3回以内) [11] またはアフェットフロアブル 2,000 倍 (7日前まで/1回以内) [7] 株腐細菌病 … Zボルドー 500 倍 (ー/ー) [M1]
未成熟ソラマメ	灰色かび病・菌核病 … ファンタジスタ顆粒水和剤 2,000 倍 (前日まで/3回以内) [11] またはアフェットフロアブル 2,000 倍 (前日まで/3回以内) [7]
野菜類 (パレisho、ラッキョウ、ダイコン、サヤインゲンなど)	軟腐病など … Zボルドー 500 倍 (ー/ー) [M1]

注) 表中[ ]内にはFRACコードを記載しました(コードが2つは2成分)

### ◎生育回復の対策 (葉面散布剤の使用方法)

<葉菜類や根菜類>

- 1) メリット青 300~500 倍 + グリーンセーフ S 1,000 倍を、3~5 日おきに 2 回程度の葉面散布を行います。 または
- 2) ファイトオーツー 1,000 倍 + ファイトマジック 1,000 倍を、5~7 日おきに 2~3 回の葉面散布を行います。

<果菜類>

- 1) メリット青またはメリット黄 300~500 倍 + グリーンセーフ S 1,000 倍を、3~5 日おきに 2 回程度の葉面散布を行います。

※ 青・黄は生育に応じて使い分けてください。

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

※ JA全農いばらきホームページでもご覧になれます。



生産資材部 営農企画課

電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040