



営農NEWS



半促成メロンの病害虫発生に注意しましょう

ハウス半促成メロン栽培では、これから果実収穫期まで、茎葉等に発生する病害虫には十分な注意が必要です。メロン栽培で生育の中～後期に発生してくる主な病害虫として、つる枯病、菌核病、うどんこ病、べと病、アブラムシ類、ハダニ類、コナジラミ類、アザミウマ類などがあります。病害は、いずれも多湿条件や曇雨天が続くと多発生しやすい傾向ですが、うどんこ病では乾燥条件でも蔓延します。害虫類は、比較的高温や乾燥条件を好み、ハウス内や周辺に害虫の寄生植物や雑草があると、そこから移動してきて増殖します。

【防除対策のポイント】

- 1) 下葉や葉の込み合っている場所の葉裏などを丁寧に観察し、病害虫の早期発見に努めます。
- 2) 病害虫の発生を確認したら、必要に応じて早期に防除に努めてください。薬剤散布は、葉裏や下葉にもよくかかるよう丁寧に行うことが特に重要です。なお、**収穫前日数に十分注意して、薬剤を選択**してください。
- 3) ミツバチ交配の場合は、交配期が終わるまで、ミツバチへの影響日数（目安）に十分注意が必要です。
- 4) 薬剤耐性菌や抵抗性害虫の発生を抑制するため、分類（コード）の異なる薬剤でローテーション散布してください。

表1 メロン つる枯病、菌核病、うどんこ病、べと病の主な防除薬剤 (令和3年3月1日現在)

対象病害				薬剤名	希釈倍数	使用時期／使用回数	分類	ミツバチ※※※
つる枯病	菌核病	うどんこ病	べと病					
○	○	○		ベルコートフロアブル ※	1,000倍	収穫前日まで／5回以内	M7	○
○			○	ベンコゼブ（ジマンダイセン）水和剤	400～600倍	収穫7日前まで／5回以内	M3	1日
		○			700倍			
			○	ダコニール1000 ※※	700～1,000倍	収穫3日前まで／5回以内	M5	○
○					1,000倍			
○			○	プロポーズ顆粒水和剤 ※※	1,000倍	収穫3日前まで／5回以内	40とM5	1日
○	○	○		パレード20フロアブル	2,000～4,000倍	収穫前日まで／3回以内	7	○
○	○	○		ファンベル顆粒水和剤 ※	1,000倍	収穫前日まで／5回以内	11とM7	—
○		○		ポリオキシソール水溶剤	1,000～2,000倍	収穫前日まで／5回以内	19	○
	○			スミレックス水和剤	2,000倍	収穫前日まで／3回以内	2	1日
		○		パンチョTF顆粒水和剤	2,000倍	収穫前日まで／2回以内	3とU6	○
		○		カスミンボルドー	1,000倍	収穫3日前まで／5回以内	24とM1	—
			○	フェスティバルC水和剤	1,000倍	収穫前日まで／3回以内	40とM1	1日

注1) 表1、表2の①分類欄には、FRACまたはIRACコードを記載しました。同一分類（コード）は作用点が同じなので、連用は避ける。②※※※印は、ミツバチへの影響日数（目安）を令和2年版県防除指針から、1日は24時間影響あり、○は薬液が乾けば影響なし、—は掲載なし又は不明を表示。
注2) 表1の※印の薬剤には有効成分イミノクタジンが、※※にはTPNが含まれており、農薬の総使用回数に注意する。

表2 メロン アブラムシ類、ハダニ類、アザミウマ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類の主な防除薬剤 (令和3年3月1日現在)

対象害虫					薬剤名	希釈倍数	使用時期／使用回数	分類	ミツバチ※※※
アブラムシ類	ハダニ類	アザミウマ類	コナジラミ類	ハモグリバエ類					
○			○		ウララDF	2,000～4,000倍	収穫前日まで／2回以内	29	○
						2,000倍			
○	○	○	○		モベントフロアブル	2,000倍	収穫前日まで／3回以内	23	1日
	○	○	○		グレースシア乳剤	2,000倍	収穫前日まで／2回以内	30	—
		○ミナミ			カスケード乳剤	2,000～4,000倍	収穫7日前まで／3回以内	15	1日
			○カバコ	○トマト		2,000倍			
	○		○	○	コロマイト乳剤	1,000倍	収穫前日まで／2回以内	6	1日
	○				マイトコーネフロアブル	1,000倍	収穫前日まで／1回	20D	1日
		○		○	ディアナSC	2,500～5,000倍	収穫前日まで／2回以内	5	3日
			○			2,500倍			
○	○		○		サンマイトフロアブル	1,000～1,500倍	収穫3日前まで／2回以内	21A	4日
○						3,000倍			
		○			スタークル顆粒水溶剤	2,000倍	収穫3日前まで／2回以内	4A	14日
			○			2,000～3,000倍			

注) 表2中の○ミナミはミナミキイロアザミウマ、○カバコはタバココナジラミ類、○トマトはトマトハモグリバエで農薬登録されている。

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

※JA全農いばらきホームページでもご覧になれます。

