



営農NEWS



春レタスの灰色かび病や菌核病など、春ハクサイのべと病などの発生に十分注意しましょう

春のレタスやハクサイ栽培では気温の上昇とともに、トンネル被覆の開閉等による換気や被覆の除去が行われています。これから収穫に向けて、病害虫の被害発生にも注意して良品生産に努めてください。

県病害虫防除所の病害虫発生予報4月号によると、3月中旬現在、春レタスでの灰色かび病の発生は平年より多く、菌核病は平年並～やや多く、腐敗病は平年並の発生で、4月もこのまま推移すると予想しています。また、春ハクサイではべと病、白斑病とも平年並の発生で、4月もこのまま推移すると予想しています。

これらの病害が発生すると品質が低下するので、管理作業の時などには十分注意して病害の早期発見に努め、発病株があれば早期に圃場外に持ち出して適切に処分してください。

なお、病害が発生している場合は、抜き取り後に、発病株を中心に有効薬剤のスポット（部分）散布を行うなど、被害の拡大を抑えることが重要です。薬剤防除を行う際は、**収穫前日数に十分注意**して、晴天日を選んで、株全体に丁寧に散布し、薬液が夕方までには乾くような時間帯に散布を済ませてください。薬剤によっては、**収穫間際の**散布および連用により薬害や汚れの生じる場合がありますので、**注意事項をよく参照**してください。

表1 レタスまたは非結球レタス灰色かび病、菌核病の主な防除薬剤 (令和3年4月1日現在)

薬剤名	レタス	非結球レタス	希釈倍率	使用時期 / 使用回数	分類
パレード20フロアブル	○	○	2,000~4,000倍	収穫前日まで / 3回以内	7
ファンタジスタ顆粒水和剤	○	○	2,000~3,000倍	収穫3日前まで / 3回以内 収穫14日前まで / 3回以内	11
トップジンM水和剤	○	○	1,500~2,000倍	収穫7日前まで / 2回以内 収穫21日前まで / 2回以内	1
シグナムWDG	○	○	1,500倍	収穫7日前まで / 2回以内 収穫14日前まで / 2回以内	7と11
スミレックス水和剤	○		1,000~2,000倍	収穫7日前まで / 5回以内	2
ゲッター水和剤	○		1,500倍	収穫7日前まで / 2回以内	1と10

表2 レタスまたは非結球レタス腐敗病の主な防除薬剤 (令和3年4月1日現在)

薬剤名	レタス	非結球レタス	希釈倍率	使用時期 / 使用回数	分類
スターナ水和剤	○	○	2,000倍	収穫7日前まで / 2回以内 収穫14日前まで / 2回以内	31
カスミンボルドー	○	○	1,000倍	収穫7日前まで / 4回以内 収穫21日前まで / 4回以内	24とM1
バリダシン液剤5	○	○	800倍	収穫7日前まで / 3回以内	U18
カセット水和剤	○	○	1,000倍	収穫7日前まで / 2回以内 収穫21日前まで / 2回以内	24と31

表3 ハクサイべと病または白斑病の主な防除薬剤 (令和3年4月1日現在)

薬剤名	べと病	白斑病	希釈倍率	使用時期 / 使用回数	分類
ストロビーフロアブル	○	○	3,000倍	収穫3日前まで / 3回以内	11
ランマンフロアブル	○		2,000倍	収穫3日前まで / 4回以内	21
ダコニール1000	○	○	1,000倍	収穫7日前まで / 2回以内	M5
プロポーズ顆粒水和剤	○	○	1,000倍	収穫7日前まで / 2回以内	40とM5
オーソサイド水和剤80	○	○	600倍 600~1,200倍	収穫7日前まで / 5回以内	M4
シグナムWDG	○	○	1,500~2,000倍	収穫7日前まで / 3回以内	7と11
ホライズンドライフロアブル	○		2,500~5,000倍	収穫14日前まで / 3回以内	11と27
ロブラール水和剤		○	1,000~1,500倍	収穫14日前まで / 3回以内	2

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

※JA全農いばらきホームページでもご覧になれます。

