



## 台風7号への備えと通過後の被害軽減対策

台風7号が8日、日本の南海上で発生しました。今後北西方向に進むと予想されており、13日に関東や東海地方の沿岸部の一部が暴風警戒域に入る可能性があります。下記を参考に台風への備えに必要な対策を実施してください。

### 1 事前の対策

- 1) 排水の悪い圃場や施設では、周囲や圃場内に明渠を掘る。また、排水用のポンプなどを準備しておきます。
- 2) パイプハウスなど施設では、ハウスバンドや被覆資材の取り付け金具などを点検し、強風等に備えてください。
- 3) 果樹園等でも、支柱やネットの強度を確認し、弱い部分は補強しておきます。



### 2 被害を受けた圃場の対策

農業用ハウスについては「茨城県農業用ハウス災害被害防止マニュアル(令和4年8月改定)」を参考にしてください。 <https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/nougi/kenfu/housemanual.html>

- 1) 水田や露地圃場または施設内が浸水および冠水した場合は、速やかな排水対策を行います。
- 2) 作物に付着した泥はできるだけ落とし、損傷した茎葉は可能な限り取り除きましょう。
- 3) 果樹は、樹体損傷の程度に応じて、修復や被害果の摘除、損傷部への塗布剤による保護などを行います。
- 4) 土壌の乾き具合や作物の草勢を観察しながら、液肥の葉面散布や追肥後に中耕、培土などを行います。
- 5) 露地野菜などが風雨にたたかれると病害発生の原因になりますので、状況に応じて殺菌剤の予防散布に努めます。

### 3 病害の予防対策

(主な防除薬剤一覧: 使用薬剤の収穫前日数および総使用回数に十分注意して下さい) (令和5年8月9日現在)

作物名	病害名	薬剤名	希釈倍数	使用時期・使用回数	分類
加工トマト	疫病	アミスターオプティフロアブル	1,000倍	前日まで/4回以内	11とM5
		ホライズンドライフロアブル	1,500~2,500倍	前日まで/3回以内	11と27
	斑点細菌病	カスミンボルドー	1,000倍	前日まで/5回以内	24とM1
ナス	褐色腐敗病	プロポーズ顆粒水和剤	1,000倍	前日まで/4回以内	40とM5
		ランマンフロアブル	2,000倍	前日まで/4回以内	21
	すすかび病	ダコニール1000	1,000倍	前日まで/4回以内	M5
		ファンタジスタ顆粒水和剤	2,000倍	前日まで/3回以内	11
		ベルコートフロアブル	2,000倍	前日まで/3回以内	M7
ネギ	軟腐病	バリダシン液剤5	500倍	前日まで/2回以内	U18
		スターナ水和剤	2,000倍	7日前まで/3回以内	31
		カスミンボルドー	1,000倍	14日前まで/2回以内	24とM1
	黒斑病・べと病	ダコニール1000	1,000倍	14日前まで/3回以内	M5
ショウガ	根茎腐敗病	オラクル顆粒水和剤	2,000倍	3日前まで/3回以内	21
		ユニフォーム粒剤	(1~3ℓ/m <sup>2</sup> 土壌灌注) 18kg/10a (土壌表面散布)	30日前まで/3回以内	4と11
	紋枯病	バリダシン液剤5	800倍	14日前まで/4回以内	U18
カボチャ	疫病	アリエッティ水和剤	400~800倍	前日まで/3回以内	P7
		ランマンフロアブル	2,000倍	前日まで/3回以内	21
		フェスティバルC水和剤	1,000倍	3日前まで/3回以内	40とM1
	果実斑点細菌病	Zボルドー	500倍	-/-	M1
ニガウリ	斑点病	ダコニール1000	1,000倍	前日まで/4回以内	M5
		トップジンM水和剤	1,500~2,000倍	前日まで/5回以内	1
	うどんこ病	Zボルドー	500倍	-/-	M1
ニラ	さび病・白斑葉枯病	アフェットフロアブル	2,000倍	前日まで/2回以内	7
		ストロビーフロアブル	3,000倍	前日まで/3回以内	11
	株腐細菌病	Zボルドー	500倍	-/-	M1
ヤマノイモ	炭疽病・葉渋病	Zボルドー	500倍	-/-	M1
		トップジンM水和剤	800倍	7日前まで/5回以内	1
		ペンコゼブ(ジマンダ <sup>®</sup> 他)水和剤	400~600倍	21日前まで/4回以内	M3
		ダコニール1000	1,000倍	30日前まで/6回以内	M5
野菜類(ゴボウ、サトイモ、オクラなど)			軟腐病など... Zボルドー 500倍(-/-) [M1]		
果樹(ナシ、ブドウ、カキ、リンゴなど)			病害虫参考防除例を参照して、予防に努める		

### 4 作物生育の回復対策(葉面散布剤の使用例)

<葉菜類や根菜類> メリット青 500~800倍 + グリーンセーフプラス 800~1,000倍 + カルタス 500倍を、3~7日おきに2回程度の葉面散布を行います。

<果菜類> メリット青またはメリット黄 500倍 + グリーンセーフプラス 800~1,000倍 + カルタス 500倍を、3~7日おきに2回程度の葉面散布を行います。 ※ 青・黄は生育に応じて使い分けてください。

■ 農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

■ 営農 News は JA全農いばらきホームページでもご覧になれます。