



台風13号による被害軽減対策について

気象庁によると台風第13号は、8日(金)6時には東海道沖に達し、9日(土)3時には関東地方に達すると予想されており、強風や大雨に警戒が必要です。強風雨の被害を軽減する手段を事前に確認し、通過後は必要な対策を実施してください。

特に、露地野菜などが風雨にたたかれると病害発生の原因になりますので、状況に応じて殺菌剤の予防散布に努めます。

なお、事前の対策や被害を受けた圃場の対策については、令和5年8月9日 営農News第3071号をご覧ください。

また、農業総合センターより「台風の接近・通過による農作物等の被害防止に向けた対策について」が情報提供されておりますので参考に願います(<https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/nosose/cont/img/file1052.pdf>)。

病害の予防対策

(主な防除薬剤一覧(令和5年9月7日現在) 使用薬剤の収穫前日数および総使用回数に十分注意してください)

作物名	病害名	薬剤名	希釈倍数	使用時期・使用回数	分類
イチゴ	炭疽病	ゲッター水和剤 セイビアーフロアブル 20	1,000倍 1,000倍	収穫開始21日前まで/3回以内 前日まで/3回以内	1と10 12
	疫病	ランマンフロアブル レーバスフロアブル	500~1,000倍 2,000倍 <small>100m²/株 株元灌注</small>	30日前まで/2回以内 前日まで/2回以内	21 40
キャベツ	黒腐病・黒斑細菌病・軟腐病	カスミンボルドー カセット水和剤 Zボルドー	1,000倍 1,000倍 500倍	7日前まで/4回以内 7日前まで/3回以内 -/-	24とM1 24と31 M1
	株腐病	バリダシン液剤5	800倍	7日前まで/5回以内	U18
シュンギク	炭疽病	アミスター20フロアブル	2,000倍	前日まで/2回以内	11
	べと病	Zボルドー	500倍	-/-	M1
ダイコン	軟腐病・黒斑細菌病	カスミンボルドー Zボルドー	1,000倍 500倍	14日前まで/3回以内 -/-	24とM1 M1
ナス	褐色腐敗病	プロポーズ顆粒水和剤 ランマンフロアブル	1,000倍 2,000倍	前日まで/4回以内 前日まで/4回以内	40とM5 21
	灰色かび病	ゲッター水和剤 ベルコートフロアブル	1,000~1,500倍 2,000倍	前日まで/5回以内 前日まで/3回以内	1と10 M7
ニンジン	軟腐病・黒葉枯病	カスミンボルドー	1,000倍	14日前まで/2回以内	24とM1
	黒葉枯病	ロブラール水和剤 ベルコートフロアブル	1,000~1,500倍 1,000倍	14日前まで/4回以内 14日前まで/5回以内	2 M7
ネギ	軟腐病	スターナ水和剤 カスミンボルドー	2,000倍 1,000倍	7日前まで/3回以内 14日前まで/2回以内	31 24とM1
	葉枯病・黒斑病・べと病・さび病	ダコニール1000	1,000倍	14日前まで/3回以内	M5
ハクサイ	黒斑細菌病・軟腐病	カセット水和剤	1,000倍	21日前まで/2回以内	24と31
		スターナ水和剤	1,000倍	7日前まで/3回以内	31
		バリダシン液剤5	500倍	3日前まで/3回以内	U18
べと病・白斑病・黒斑病	ダコニール1000	1000倍	7日前まで/2回以内	M5	
	ペンセブ(ジマンダイト)水和剤	600倍	30日前まで/1回	M3	
ハウレンソウ	べと病	ランマンフロアブル	2,000倍	3日前まで/3回以内	21
		ピシロックフロアブル	1,000倍	前日まで/2回以内	U17
ブロッコリー	黒腐病	カスミンボルドー	1,000倍	7日前まで/4回以内	24とM1
		カセット水和剤	1,000倍	14日前まで/2回以内	24と31
		Zボルドー	500倍	-/-	M1
レタス (非結球レタスを除く)	斑点細菌病・腐敗病	カスミンボルドー	1,000倍	7日前まで/4回以内	24とM1
		カセット水和剤	1,000倍	7日前まで/2回以内	24と31
	菌核病	アフエットフロアブル スミレックス水和剤	2,000倍 1,000~2,000倍	前日まで/3回以内 7日前まで/5回以内	7 2
その他野菜類(ニラ、コマツナ、カブなど)			軟腐病・べと病など… Zボルドー 500倍(-/-) [M1]		
果樹(ナシ、ブドウ、カキ、リンゴなど)			病害虫参考防除例を参照して、予防に努める		

作物生育の回復対策(葉面散布剤の使用例)

<葉菜類や根菜類> **メリット青** 500~800倍+グリーンセーフプラス 800~1,000倍+カルタス 500倍を、3~7日おきに2回程度の葉面散布を行います。

<果菜類> **メリット青**または**メリット黄** 500倍+グリーンセーフプラス 800~1,000倍+カルタス 500倍を、3~7日おきに2回程度の葉面散布を行います。 ※ 青・黄は生育に応じて使い分けてください。

- 農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。
- 営農 News は JA全農いばらきホームページでもご覧になれます。