



台風 10 号による被害軽減対策について



8 月 30 日に気象庁が発表した台風第 10 号に関する情報第 127 号によると、台風第 10 号は、9 月 2 日頃にかけて西日本を東へ進む見込みです。このため、西日本や東日本では、31 日にかけて線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があり、31 日にかけて非常に強い風が吹く見込みです。被害を軽減する手段を事前に確認し、通過後は必要な対策を実施してください。

特に、露地野菜などが風雨にたたかれると病害発生の原因になりますので、状況に応じて殺菌剤の予防散布に努めます。

なお、事前の対策や被害を受けた圃場の対策については、営農 News 第 3175 号（令和 6 年 8 月 9 日）、営農 News 第 3176 号（令和 6 年 8 月 15 日）をご覧ください。

また、農業総合センターより「台風の接近・通過による農作物等の被害防止に向けた対策について」が情報提供されておりますので参考に願います（<https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/nosose/cont/img/file1.pdf>）。

病害の予防対策

（主な防除薬剤一覧（令和 6 年 8 月 20 日現在）使用薬剤の収穫前日数および総使用回数に十分注意してください）

作物名	病害名	薬剤名	希釈倍数	使用時期・使用回数	分類
イチゴ	炭疽病	アントラコール顆粒水和剤	500 倍	仮植栽培期／6 回以内	M03
		セイビアーフロアブル 20	1,000 倍	前日まで／3 回以内	12
		ベルコートフロアブル	1,000 倍	育苗期（定植前）／5 回以内	M07
		〃	2,000 倍	前日まで／5 回以内	
	疫病	ランマンフロアブル	500～1,000 倍 (100 mL／株 株元灌注)	30 日前まで／2 回以内	21
		レーバスフロアブル	2,000 倍	前日まで／2 回以内	40
キャベツ	黒腐病・黒斑細菌病・軟腐病	カスミンボルドー	1,000 倍	7 日前まで／4 回以内	24 と M01
		カセット水和剤	1,000 倍	7 日前まで／3 回以内	24 と 31
		Zボルドー	500 倍	－／－	M01
	株腐病	バリダシン液剤 5	800 倍	7 日前まで／5 回以内	U18
シュンギク	炭疽病	アミスター-20 フロアブル	2,000 倍	前日まで／2 回以内	11
	べと病	Zボルドー	500 倍	－／－	M01
ダイコン	軟腐病・黒斑細菌病	カスミンボルドー	1,000 倍	14 日前まで／3 回以内	24 と M01
		Zボルドー	500 倍	－／－	M01
ナス	褐色腐敗病	プロポーズ顆粒水和剤	1,000 倍	前日まで／4 回以内	40 と M05
		ランマンフロアブル	2,000 倍	前日まで／4 回以内	21
		ゲッター水和剤	1,000～1,500 倍	前日まで／5 回以内	1 と 10
	灰色かび病	ベルコートフロアブル	2,000 倍	前日まで／3 回以内	M07
ニンジン	軟腐病・黒葉枯病	カスミンボルドー	1,000 倍	7 日前まで／2 回以内	24 と M01
	黒葉枯病	ロブラール水和剤	1,000～1,500 倍	14 日前まで／4 回以内	2
		ベルコートフロアブル	1,000 倍	14 日前まで／5 回以内	M07
ネギ	軟腐病	スターナ水和剤	2,000 倍	7 日前まで／3 回以内	31
		カスミンボルドー	1,000 倍	14 日前まで／2 回以内	24 と M01
	葉枯病・黒斑病・べと病・さび病	ダコニール 1 0 0 0	1,000 倍	14 日前まで／3 回以内	M05
ハクサイ	黒斑細菌病・軟腐病	カセット水和剤	1,000 倍	21 日前まで／2 回以内	24 と 31
		スターナ水和剤	1,000 倍	7 日前まで／3 回以内	31
		バリダシン液剤 5	500 倍	3 日前まで／3 回以内	U18
	べと病・白斑病・黒斑病	ダコニール 1 0 0 0	1,000 倍	7 日前まで／2 回以内	M05
		ベンゼン（ジメチル）水和剤	600 倍	30 日前まで／1 回	M03
ハウレンソウ	べと病	ランマンフロアブル	2,000 倍	3 日前まで／3 回以内	21
		ピシロックフロアブル	1,000 倍	前日まで／2 回以内	U17
ブロッコリー	黒腐病	カスミンボルドー	1,000 倍	7 日前まで／4 回以内	24 と M01
		カセット水和剤	1,000 倍	14 日前まで／2 回以内	24 と 31
		Zボルドー	500～1,000 倍	－／－	M01
レタス (非結球レタスを除く)	斑点細菌病・腐敗病	カスミンボルドー	1,000 倍	7 日前まで／4 回以内	24 と M01
		カセット水和剤	1,000 倍	7 日前まで／2 回以内	24 と 31
	菌核病	アフエットフロアブル	2,000 倍	前日まで／3 回以内	7
		スミレックス水和剤	1,000～2,000 倍	7 日前まで／5 回以内	2
その他野菜類（ニラ、コマツナ、カブなど）			軟腐病・べと病など … Zボルドー 500 倍（－／－）[M01]		
果樹（ナシ、ブドウ、カキ、リンゴなど）			病害虫参考防除例を参照して、予防に努める		

作物生育の回復対策（葉面散布剤の使用例）

＜葉菜類や根菜類＞ **メリット青** 500～800 倍＋グリーンセーフプラス 800～1,000 倍＋カルタス 500 倍を、3～7 日おきに 2 回程度の葉面散布を行います（＊：ハクサイ、コマツナ等）。

＜果菜類＞ **メリット青**または**メリット黄** 500 倍＋グリーンセーフプラス 800～1,000 倍＋カルタス 500 倍を、3～7 日おきに 2 回程度の葉面散布を行います。 ※ 青・黄は生育に応じて使い分けてください。

■ 農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

■ 営農 News は J A 全農いばらきホームページでもご覧になれます。

農機営農支援部 営農支援課 電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040