

レタスの害虫防除対策

レタスの生育中にはオオタバコガ、ハスモンヨトウなどチョウ目害虫（8月9日付け営農 News 第 3174 参照 [3174.pdf \(zennoh.or.jp\)](https://zennoh.or.jp)）やハモグリバエ類などが食害する他、アブラムシ類などが株に寄生して吸汁害などを発生します。

レタス生育初中期の害虫対策として育苗期後半にベリマーク SC やジュリボフロアブルなどの灌注処理、定植時にモスピラン粒剤などの株元散布を行うと、処理後 2 週間～1 か月くらいの防除効果が期待できます。

病害虫発生予報 9 月号（県病害虫防除所）によると、9 月におけるオオタバコガの発生量はやや多い、シロイチモジヨトウは多い、ハスモンヨトウは平年並～やや多いと予測していますので、下記の表 1 を参考に、各種害虫の発生初期に防除を徹底してください。

なお、レタス類は結球や非結球、収穫部位等の違いによって下記の一覧表のようにエンダイブ、トレビス、非結球レタス、プンタレッラ、レタスに分かれており、**農薬登録内容（使用基準）が異なる場合があります。使用の際は、農薬のラベル等で確認し、適正に使用してください。**



オオタバコガ成虫

写真：病害虫防除所



オオタバコガ幼虫

適用農作物の一覧

小作物群	作物名	作物名に含まれる別名、地方名、品種名等の例	備考(収穫部位等)
レタス類	エンダイブ	ニガヂシャ、キクヂシャ	茎葉を収穫するもの
	トレビス	トレビツ	結球した茎葉を収穫するもの
	非結球レタス	かきちしゃ(サンチュ、チマサンチュ)	葉を収穫するもの
		サラダ菜(バターヘッド型レタス、バターヘッド型たまちしゃ)、立ちちしゃ(ロメインレタス、コスレタス)、美味タス(ピミタス)、リーフレタス(葉ちしゃ、チリメンチシャ、サニーレタス、シルクレタス、フリルレタス、オークリーフレタス、バタビアレタス、ロロロッサ)	茎葉を収穫するもの
	プンタレッラ		花茎及び葉を収穫するもの
	レタス	クリスピーヘッド型たまちしゃ	結球した茎葉を収穫するもの

表 1 レタスまたは非結球レタスの本圃（生育期）における主要害虫の主な防除薬剤（令和 6 年 9 月 4 日現在）

薬 剤 名	ハスモンヨトウ		オオタバコガ		シロイチモジヨトウ		ヨトウムシ		ナモグリバエ		アブラムシ類		分類
	レタス	非結球レタス	レタス	非結球レタス	レタス	非結球レタス	レタス	非結球レタス	レタス	非結球レタス	レタス	非結球レタス	
アクセルフロアブル	●	●	●	●									22B
アニキ乳剤	●	●	●	●	●								6
グレーシア乳剤	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			30
コテツフロアブル	●		●				●		●				13
ダントツ水溶剤									●	●	●	●	4A
ディアナ SC	●	●	●	●					●	●			5
トルネードエース DF	●	●	●	●	●	●	●	●					22A
ハチハチフロアブル									●	●	●	●	21A
フェニックス顆粒水和剤	●	●	●	●			●	●					28
プレオフロアブル	●	●	●	●	●				●	●			UN
リーフガード顆粒水和剤									●	●	●	●	14

注）分類欄には、IRAC コードを記載しました。

- 農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。
- 営農 News は J A 全農いばらきホームページでもご覧になれます。