



イチゴの害虫防除を徹底しましょう

～アブラムシ類、アザミウマ類、ハダニ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ～

病害虫発生予報 12 月号（病害虫防除所）では、下表のとおり発生が多くなると予想されています。
特に**アザミウマ類**と**ハダニ類**では発生が多くなると予想されたことから、**病害虫速報 No.10** ([sokuhour6-10.pdf\(pref.ibaraki.jp\)](http://sokuhour6-10.pdf(pref.ibaraki.jp)))
No.11 ([sokuhour6-11.pdf\(pref.ibaraki.jp\)](http://sokuhour6-11.pdf(pref.ibaraki.jp))) を発表し注意を喚起しています。早期発見に努め下記を参考に防除を徹底してください。

	アザミウマ類	ハダニ類	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ
発生量	多い	多い	やや多い	並～やや多い	やや多い



防除のポイント

- 1) 初発生を見逃さないよう、葉裏や葉柄、果梗、蕾および株元などを丁寧に観察し、発生を認めたら早期に薬剤防除を実施し、**葉裏や下葉、株元等にも薬液がよくかかるよう丁寧に散布**することが特に重要です。
- 2) **ミツバチや天敵を使用する場合は**、薬剤の影響についてメーカーや関係機関の指導を受けるなど注意してください。
- 3) **連続して薬剤を使用すると、抵抗性が出現しやすい傾向がありますので、分類の異なる薬剤でローテーション散布**してください。

表 1 イチゴ **アザミウマ類、アブラムシ類、オオタバコガ、ハスモンヨトウ**の主な防除薬剤（令和 6 年 12 月 5 日現在）

薬 剤 名	アザミウマ類	アブラムシ類	オオタバコガ	ハスモンヨトウ	希釈倍率	使用時期 / 使用回数	ミツバチ※	分類
アフーム乳剤			○	○	2,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	2 日	6
ウララ DF		○			2,000～4,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	○	29
グレーシア乳剤	○		○	○	2,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	1 日	30
ディアナ SC	○			○	2,500～5,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	3 日	5
トランスフォームフロアブル		○			2,000 倍	収穫前日まで / 3 回以内	10 日	4C
トルネードエース DF			○	○	2,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	1 日	22A
ファインセーブフロアブル	○				1,000～2,000 倍	収穫前日まで / 3 回以内	1 日	34
ファルコンフロアブル			○	○	4,000 倍	収穫前日まで / 3 回以内	1 日	18
フェニックス顆粒水和剤			○	○	2,000～4,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	1 日	28
プレオフロアブル	○		○	○	1,000 倍	収穫前日まで / 4 回以内	1 日	UN
ベストガード水溶剤		○			2,000 倍	収穫前日まで / 3 回以内	6 日	4A
ベネビア OD	○	○			2,000 倍	収穫前日まで / 3 回以内	1 日	28
				○	2,000～4,000 倍			
マッチ乳剤	○				1,000～2,000 倍	収穫前日まで / 4 回以内	1 日	15
				○	3,000 倍			
モスピラン顆粒水溶剤		○			2,000～4,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	1 日	4A
	○				2,000 倍			
モベントフロアブル	○	○			2,000 倍	収穫前日まで / 3 回以内	1 日	23

注 1) 各表のミツバチ※は、ミツバチへの影響の目安を茨城県病害虫防除指針（令和 6 年版）及び農業メーカー資料より抜粋しました。○は薬液が乾けば影響なし、その他は影響日数を記載しましたが、天候、施設内の環境条件により日数が前後することがあり、注意が必要です。
注 2) 分類欄には、IRAC コードを記載しました。同一分類（コード）は作用点が同じなので、連用は避けてください。

表 2 イチゴ **ハダニ類**の主な防除薬剤（令和 6 年 12 月 5 日現在）

薬 剤 名	希釈倍率	使用時期 / 使用回数	ミツバチ※	分類
カネマイトフロアブル	1,000～1,500 倍	収穫前日まで / 1 回	○	20B
グレーシア乳剤	2,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	1 日	30
コテツフロアブル	2,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	10 日	13
コロマイト水和剤	2,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	1 日	6
スターマイトフロアブル	2,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	1 日	25A
マイトコーネフロアブル	1,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	1 日	20D
粘着くん液剤	100 倍	収穫前日まで / ー	1 日	ー

- 農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。
- 営農 News は J A 全農いばらきホームページでもご覧になれます。