

ラッキョウの病害虫防除対策

ラッキョウ（エシャレット栽培含む）は、今後曇雨天が続くような場合には病害が発生しやすくなりますので、事前の予防散布、病害の早期発見や防除に努めてください。

なお、**薬剤の散布に際しては、収穫前日数に十分注意し、株元や葉全体に丁寧に散布することが必要です。**

病害：

- ・白色疫病
- ・灰色かび病
- ・さび病
- ・軟腐病

虫害：

- ・ネギアザミウマ
- ・ネギハモグリバエ
- ・ネダニ




表 1 ラッキョウ（エシャレット栽培含む） 各種病害の主な防除薬剤 （令和 7 年 2 月 6 日現在）

薬 剤 名	病 害 名				希釈倍率	使用時期 / 使用回数	分類
	白色疫病	灰色かび病	さび病	軟腐病			
フォリオゴールド	○				1,000 倍	収穫 14 日前まで / 3 回以内	4 と M05
プロポーズ顆粒水和剤	○				1,000 倍	収穫 14 日前まで / 3 回以内	40 と M05
ホライズンドライフロアブル	○				1,000 倍	収穫 21 日前まで / 3 回以内	11 と 27
ランマンフロアブル	○				2,000 倍	収穫 3 日前まで / 4 回以内	21
カンタスドライフロアブル		○			1,500 倍	収穫前日まで / 3 回以内	7
セイビアーフロアブル 20		○			1,000~1,500 倍	収穫前日まで / 3 回以内	12
ベルコートフロアブル		○			1,000 倍	収穫 7 日前まで / 5 回以内	M07
アミスター 20 フロアブル			○		2,000 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内	11
スターナ水和剤				○	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内	31
Zボルドー				○	500~1,000 倍	— / —	M01

注）分類欄には、FRAC コードを記載しました（コードが 2 つは混合剤）。同一分類（コード）の連用は避けてください。

表 2 ラッキョウ（エシャレット栽培含む） 各種害虫の主な防除薬剤 （令和 7 年 2 月 6 日現在）

薬 剤 名	害 虫 名		希釈倍率	使用時期 / 使用回数	分類
	アザミウマ類	ハモグリバエ類			
スピノエース顆粒水和剤	○		2,500 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内	5
ディアナ SC	○	○	2,500~5,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	5
ハチハチ乳剤	○		1,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	21 A
モスピラン顆粒水溶剤	○		2,000 倍	収穫 14 日前まで / 3 回以内	4 A
プレバソンフロアブル 5		○	2,000 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内	28

注）表 2、3 の分類欄には、IRAC コードを記載しました。同一分類（コード）の連用は避けてください。

表 3 ラッキョウ（エシャレット栽培含む） ネダニ類の主な防除薬剤 （令和 7 年 2 月 6 日現在）

薬 剤 名	希釈倍率・使用量	使用時期 / 使用回数	分類
グレーシア乳剤	2,000 倍 1ℓ/m ² 株元灌注	収穫 30 日前まで / 2 回以内	30
トクチオン乳剤	2,000 倍 3ℓ/m ² 株元灌注	収穫 60 日前まで / 1 回	1B
フォース粒剤	6~9 kg/10a 株元散布	収穫 14 日前まで / 1 回	3A

発生してからでは防除が困難なのでネダニが発生していない球根、苗を使用することが大切です

■ 農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。

■ 営農 News は JA 全農いばらきホームページでもご覧になれます。

農機営農支援部 営農支援課 電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040