



ニンニクの病害虫防除対策

今後、曇雨天が続くような場合には病害が発生しやすくなりますので、事前の予防散布、病害の早期発見や防除に努めてください。なお、薬剤の散布に際しては、収穫前日数に十分注意し、株元や葉全体に丁寧に散布することが必要です。

病害

- ・葉枯病
- ・黄斑病
- ・さび病
- ・白斑葉枯病
- ・春腐病

虫害

- ・アザミウマ類
- ・アブラムシ類
- ・ネギコガ



表1 ニンニク 各種病害の主な防除薬剤

(令和 7 年 2 月 19 日現在)

薬 剤 名	病 害 名					希釈倍率	使用時期 / 使用回数	分類
	葉枯病	黄斑病	さび病	白斑葉枯病	春腐病			
ダコニール1000	○	○	○	○		1,000 倍	収穫 7 日前まで / 6 回以内	M05
ポリベリン水和剤	○	○				1,000~1,500 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内	19 と M07
オンリーワンフロアブル	○	○	○	○		1,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内	3
シグナムWDG	○	○	○	○		1,500 倍	収穫 3 日前まで / 3 回以内	7 と 11
アミスター20フロアブル	○		○			2,000 倍	収穫 7 日前まで / 3 回以内	11
バリダシン液剤5					○	800 倍	収穫 3 日前まで / 5 回以内	U18
カスミンボルドー					○	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 5 回以内	24 と M01
Zボルドー			○	○	○	500 倍	— / —	M01

注) 分類欄には、FRAC コードを記載しました (コードが 2 つは混合剤)。同一分類 (コード) の連用は避けてください。

表 2 ニンニク アザミウマ類、アブラムシ類、ネギコガの主な防除薬剤

(令和 7 年 2 月 19 日現在)

薬 剤 名	害 虫 名			希釈倍率	使用時期 / 使用回数	分類
	アザミウマ類	アブラムシ類	ネギコガ			
スピノエース顆粒水和剤	○			5,000 倍	収穫前日まで / 3 回以内	5
ディアナSC	○		○	2,500~5,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	5
ハチハチ乳剤	○	○	○	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 2 回以内	21A
モスピラン顆粒水溶剤	○	○	○	2,000~4,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	4A
アディオオン乳剤		○	○	2,000~3,000 倍	収穫前日まで / 2 回以内	3A
ジェイエース水溶剤		○	○	1,000 倍	収穫 7 日前まで / 2 回以内	1B

注) 表 2 の分類欄には、IRAC コードを記載しました。同一分類 (コード) の連用は避けてください。

- 農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。
- 営農 News は JA 全農いばらきホームページでもご覧になれます。