全農 JA全農いばらき

営農 News　令和 7 年 5 月 8 日　Newsletter 第 3242 号

ネギの病害（べと病、黒斑病、さび病、葉枯病など）の発生に注意しましょう！

ネギの「べと病」や「黒斑病」、「葉枯病」は被害残渣で、「さび病」は被害植物上で越年しますので、前年（前作）に多発生した圃場では、発生が多くなる傾向があります。

また、べと病やさび病では梅雨前から梅雨期にかけて比較的低温の場合に、黒斑病では比較的高温の場合に多発生しやすい傾向があります。

べと病

黒斑病

さび病

（写真：茨城県病害虫防除所）

防除のポイント

降雨の続くような好適条件が予想される場合には、降雨前や雨の合間に、薬剤の予防散布や発病初期の防除に努めてください。

1）圃場の排水を良好にし、多肥や肥切れを避けて、適切な肥培管理に努めます。
2）収穫が近くなってきたネギについては、**特に収穫前日数に注意して薬剤を選択してください**。
3）薬剤防除は、発病前または発生初期に重点を置いて、**薬液が付着しやすいよう展着剤を加用**して行います。
4）薬剤耐性菌の出現を抑制するため、分類（コード）の異なる薬剤でローテーション散布を行いましょう。

表１　ネギべと病の主な防除薬剤　（令和 7 年 5 月 7 日現在）

薬　剤　名	希釈倍率	使用時期　／　使用回数	分類
アミスター20 フロアブル	2,000 倍	収穫 3 日前まで／4 回以内	11
アリエッティ水和剤	800 倍	収穫 3 日前まで／3 回以内	P07
ランマンフロアブル	2,000 倍	収穫 3 日前まで／4 回以内	21
オロンディスウルトラＳＣ	2,000 倍	収穫 7 日前まで／2 回以内	40 と 49
ダコニール１０００　※	1,000 倍	収穫 14 日前まで／3 回以内	M05
フォリオゴールド　※	800～1,000 倍	収穫 14 日前まで／3 回以内	4 とM05
プロポーズ顆粒水和剤　※	1,000 倍	収穫 14 日前まで／3 回以内	40 とM05
ペンコゼブ（ジマンダイセン）水和剤	600 倍	収穫 14 日前まで／3 回以内	M03

注 1）表１及び２の薬剤名の※印は、有効成分にＴＰＮを含みます。有効成分の総使用回数に注意してください。
注 2）表１及び２の分類欄には、FRAC コードを記載しました（コードが 2 つは混合剤）。

表２　ネギ黒斑病、さび病、葉枯病の主な防除薬剤　（令和 7 年 5 月 7 日現在）

薬　剤　名	黒斑病	さび病	葉枯病	希釈倍率	使用時期　／　使用回数	分類
パレード 20 フロアブル		○		2,000 倍	収穫前日まで／3 回以内	7
	○		○	2,000～4,000 倍		
アミスター20 フロアブル	○	○	○	2,000 倍	収穫 3 日前まで／4 回以内	11
オキシラン水和剤	○			600 倍	収穫 14 日前まで／5 回以内	M01 とM04
オンリーワンフロアブル	○	○		1,000 倍	収穫 14 日前まで／3 回以内	3
ダコニール１０００　※	○	○	○	1,000 倍	収穫 14 日前まで／3 回以内	M05
ペンコゼブ（ジマンダイセン）水和剤	○	○		600 倍	収穫 14 日前まで／3 回以内	M03
ポリベリン水和剤	○		○	1,500 倍	収穫 14 日前まで／3 回以内	19 とM07
ロブラール水和剤	○			1,000～1,500 倍	収穫 14 日前まで／3 回以内	2

■ 農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用してください。
■ 営農 News はＪＡ全農いばらきホームページでもご覧になれます。

農機営農支援部　営農支援課　　電話：029-291-1012　FAX：029-291-1040