





# イチゴの害虫防除を徹底しましょう

～アザミウマ類、オオタバコガ、アブラムシ類、ハダニ類、ハスモンヨトウ～



病害虫発生予報 12 月号（病害虫防除所）によると、**アザミウマ類**と**オオタバコガ**の発生がやや多くなると予想されています。

発生が多くなると防除が困難となるので、**防除のポイント**を参考に早期発見に努め防除を徹底してください。



写真：ミカンキイロアザミウマ（成虫）

## 防除のポイント

- 1) 初発生を見逃さないよう、葉裏や葉柄、果梗、蕾および株元などを丁寧に観察し、発生を認めたら早期に薬剤防除を実施し、葉裏や下葉、株元等にも薬液がよくかかるよう丁寧に散布することが特に重要です。
- 2) ミツバチや天敵を使用する場合は、薬剤の影響についてメーカーや関係機関の指導を受けるなど注意してください。
- 3) 連続して薬剤を使用すると、抵抗性が出現しやすい傾向がありますので、分類の異なる薬剤でローテーション散布してください。

表 1 イチゴ **アザミウマ類、オオタバコガ、アブラムシ類、ハスモンヨトウ**の主な防除薬剤（令和 7 年 12 月 15 日現在）

| 薬剤名           | アザミウマ類 | オオタバコガ | アブラムシ類 | ハスモンヨトウ | 希釈倍率          | 使用時期 / 使用回数    | ミツバチ※ | 分類  |
|---------------|--------|--------|--------|---------|---------------|----------------|-------|-----|
| アフーム乳剤        |        | ○      |        | ○       | 2,000 倍       | 収穫前日まで / 2 回以内 | 2 日   | 6   |
| ウララ DF        |        |        | ○      |         | 2,000～4,000 倍 | 収穫前日まで / 2 回以内 | ○     | 29  |
| グレースシア乳剤      | ○      | ○      |        | ○       | 2,000 倍       | 収穫前日まで / 2 回以内 | 1 日   | 30  |
| ディアナ SC       | ○      |        |        | ○       | 2,500～5,000 倍 | 収穫前日まで / 2 回以内 | 3 日   | 5   |
| トランスフォームフロアブル |        |        | ○      |         | 2,000 倍       | 収穫前日まで / 3 回以内 | 10 日  | 4C  |
| トルネードエース DF   |        | ○      |        | ○       | 2,000 倍       | 収穫前日まで / 2 回以内 | 1 日   | 22A |
| ファインセーブフロアブル  | ○      |        |        |         | 1,000～2,000 倍 | 収穫前日まで / 3 回以内 | 1 日   | 34  |
| フェニックス顆粒水和剤   |        | ○      |        | ○       | 2,000～4,000 倍 | 収穫前日まで / 2 回以内 | 1 日   | 28  |
| プレオフロアブル      | ○      | ○      |        | ○       | 1,000 倍       | 収穫前日まで / 4 回以内 | 1 日   | UN  |
| ベストガード水溶剤     |        |        | ○      |         | 2,000 倍       | 収穫前日まで / 3 回以内 | 6 日   | 4A  |
| ベネビア OD       | ○      |        | ○      |         | 2,000 倍       | 収穫前日まで / 3 回以内 | 1 日   | 28  |
| マッチ乳剤         | ○      |        |        | ○       | 2,000～4,000 倍 | 収穫前日まで / 4 回以内 | 1 日   | 15  |
|               |        |        |        | ○       | 1,000～2,000 倍 |                |       |     |
| モスピラン顆粒水溶剤    | ○      |        | ○      |         | 2,000～4,000 倍 | 収穫前日まで / 2 回以内 | 1 日   | 4A  |
|               |        |        |        |         | 2,000 倍       |                |       |     |
| モベントフロアブル     | ○      |        | ○      |         | 2,000 倍       | 収穫前日まで / 3 回以内 | 1 日   | 23  |

注 1) 各表のミツバチ※は、ミツバチへの影響の目安を茨城県病害虫防除指針（令和 7 年版）及び農業メーカー資料より抜粋しました。○は薬液が乾けば影響なし、その他は影響日数を記載しましたが、天候、施設内の環境条件により日数が前後することがあり、注意が必要です。

注 2) 分類欄には、IRAC コードを記載しました。同一分類（コード）は作用点が同じなので、連用は避けてください。

表 2 イチゴ **ハダニ類**の主な防除薬剤（令和 7 年 12 月 15 日現在）

| 薬剤名         | 希釈倍率          | 使用時期 / 使用回数    | ミツバチ※ | 分類  |
|-------------|---------------|----------------|-------|-----|
| カネマイトフロアブル  | 1,000～1,500 倍 | 収穫前日まで / 1 回   | ○     | 20B |
| グレースシア乳剤    | 2,000 倍       | 収穫前日まで / 2 回以内 | 1 日   | 30  |
| コテツフロアブル    | 2,000 倍       | 収穫前日まで / 2 回以内 | 10 日  | 13  |
| コロマイト水和剤    | 2,000 倍       | 収穫前日まで / 2 回以内 | 1 日   | 6   |
| スターマイトフロアブル | 2,000 倍       | 収穫前日まで / 2 回以内 | 1 日   | 25A |
| ダニオーテフロアブル※ | 2,000 倍       | 収穫前日まで / 2 回以内 | ○     | 33  |
| マイトコーネフロアブル | 1,000 倍       | 収穫前日まで / 2 回以内 | 1 日   | 20D |
| 粘着くん液剤      | 100 倍         | 収穫前日まで / ー     | 1 日   | ー   |



※：防除効果が低下するおそれがあるため  
 (1) 銅剤との混用はさける。  
 (2) 本剤を散布した後に銅剤を使用する場合は 10 日以上散布間隔を空ける。  
 (3) 銅剤を散布した後は本剤の使用をさける。

■ 農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用してください。

■ 営農 News は JA 全農いばらきホームページでもご覧になれます。

農機営農支援部 営農支援課 電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040