

ナシヒメシンクイの防除対策

その2


茨城県病害虫防除所（病害虫発生予報 8 月号 [yr0808.pdf](#)）によると、ナシヒメシンクイの発生は**平年並**と予想しています。ナシヒメシンクイの幼虫はナシの果実を食害するため減収となります。防除適期を逃さず農薬散布を実施してください。



ナシヒメシンクイ成虫



ナシヒメシンクイ幼虫



ナシヒメシンクイ幼虫が排出した糞

防除のポイント

写真：茨城県病害虫防除所

- ① 被害果は、速やかに水に浸漬するか土中深く埋めてください。
- ② 早生品種（「幸水」等）で被害が認められた場合は、中生～晩生品種（「豊水」や「新高」等）で被害が多くなる傾向があるので注意してください。
- ③ 薬剤散布の時期については、下記の表 1 を参考にしてください。
- ④ 薬剤散布にあたっては、10a あたり 300ℓを目安に、かけむらの無いよう園内を縦横に走行して丁寧に行ってください。なお、園場の周縁部など薬液のかかりにくい部分に対しては、手散布等により補正散布を行うことが重要です。また、**薬剤散布の際は、表 2 を参考に収穫前日数等に十分注意してください。**

表 1 調査ほ場におけるナシヒメシンクイ第四世代幼虫の予測防除適期

地点	第四世代幼虫の予測防除適期 ¹⁾		
笠間市	8 月 9 日	～	8 月 14 日
小美玉市	8 月 4 日	～	8 月 8 日
石岡市	8 月 9 日	～	8 月 13 日
かすみがうら市	8 月 9 日	～	8 月 13 日
土浦市	8 月 13 日	～	8 月 18 日
筑西市(下館地域)	8 月 5 日	～	8 月 9 日
筑西市(関城地域)	8 月 9 日	～	8 月 13 日

1) 第二世代成虫の誘殺最盛期を基に予測した(7 月 31 日現在)。

表 1：茨城県病害虫防除所レポート
「ナシヒメシンクイの防除適期の予測」より

表 2 ナシヒメシンクイ防除薬剤一覧

(令和 8 年 8 月 6 現在)

防 除 薬 剤	希釈倍数	使用時期／回数	分類
アディオソ乳剤	2,000～3,000 倍	収穫前日まで／2 回以内	3 A
アクタラ顆粒水溶剤	2,000 倍	収穫前日まで／3 回以内	4 A
アグロスリン水和剤	1,000～2,000 倍	収穫前日まで／3 回以内	3 A
エクシレル S E	2,500～5,000 倍	収穫前日まで／3 回以内	2 8
スカウトフロアブル	2,000 倍	収穫前日まで／5 回以内	3 A
スタークル顆粒水溶剤	2,000 倍	収穫前日まで／3 回以内	4 A
ダントツ水溶剤	2,000～4,000 倍	収穫前日まで／3 回以内	4 A
テッパン液剤	2,000 倍	収穫前日まで／2 回以内	2 8
ディアナ WDG	5,000～10,000 倍	収穫前日まで／2 回以内	5
テルスターフロアブル	3,000 倍	収穫前日まで／2 回以内	3 A
バリアード顆粒水和剤	2,000～4,000 倍	収穫前日まで／3 回以内	4 A
ロディー水和剤	1,000～1,500 倍	収穫前日まで／2 回以内	3 A

注) 分類欄には、IRAC コードを記載しました。同一分類(コード)は作用点が同じなので、連用は避けてください。

- 農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用してください。
- 宮農 News は J A 全農いばらきホームページでもご覧になれます。