

台風 25 号の被害軽減対策について

9 月 21 日に台風 25 号が茨城県の東を通過し、暴風や雨によりビニールハウスや作物に被害が発生しました。作物の被害軽減対策を下記のとおりまとめましたので参考にしてください。

1 被害を受けた圃場の対策

農業用ハウスについては茨城県農業技術課有機農業・気候変動対策推進室「農業用ハウスの強靱化について」を参考にしてください。<https://www.pref.ibaraki.jp/nourinsuisan/nougi/kyoujinnka/kyoujinnka.html>

- 1) 水田や露地または施設内圃場が浸水および冠水した場合は、**速やかな排水対策**を行います。
- 2) 作物に付着した泥はできるだけ落とし、損傷した茎葉は可能な限り取り除きましょう。
- 3) 果樹は、倒伏や枝折れ等程度に応じた修復や、被害果の摘除、損傷部への塗布剤による保護などを行います。
- 4) 土壌の乾き具合や作物の草勢を観察しながら、**液肥の葉面散布や追肥後に中耕、培土**などを行います。
- 5) 露地野菜などが強風や大雨にたたかれると病害発生の原因になりますので、状況に応じて**殺菌剤の予防散布**に努めます。



2 病害の予防対策

主な防除薬剤一覧（使用薬剤の収穫前日数および総使用回数に十分注意して下さい）（令和 8 年 9 月 25 日現在）

作物名	病害名	薬剤名	希釈倍数	使用時期・使用回数	分類
カボチャ	疫病・べと病	ランマンフロアブル フェスティバルC水和剤	2,000 倍 1,000 倍	前日まで／3 回以内 3 日前まで／3 回以内	21 40 と M01
	果実斑点細菌病	Zボルドー	500 倍	発病前～発病初期／－	M01
キャベツ	黒腐病・黒斑細菌病・軟腐病	カセット水和剤 Zボルドー	1,000 倍 500 倍	7 日前まで／3 回以内 発病前～発病初期／－	24 と 31 M01
	株腐病	バリダシン液剤 5	800 倍	7 日前まで／5 回以内	U18
シュンギク	炭疽病	アミスター20 フロアブル	2,000 倍	前日まで／2 回以内	11
	べと病	Zボルドー（※野菜類登録）	500 倍	発病前～発病初期／－	M01
ダイコン	軟腐病・黒斑細菌病	カスミンボルドー Zボルドー（※野菜類登録）	1,000 倍 500 倍	14 日前まで／3 回以内 発病前～発病初期／－	24 と M01 M01
ナス	褐色腐敗病	プロポーズ顆粒水和剤 ランマンフロアブル	1,000 倍 2,000 倍	前日まで／4 回以内 前日まで／4 回以内	40 と M05 21
	すすかび病	ファンタジスタ顆粒水和剤 ベルコートフロアブル	2,000 倍 2,000 倍	前日まで／3 回以内 前日まで／3 回以内	11 M07
ネギ	軟腐病	スターナ水和剤 カスミンボルドー	2,000 倍 1,000 倍	7 日前まで／3 回以内 14 日前まで／2 回以内	31 24 と M01
	黒斑病・べと病	ダコニール1000	1,000 倍	14 日前まで／3 回以内	M05
ハクサイ	黒斑細菌病・軟腐病	カセット水和剤 バリダシン液剤 5	1,000 倍 500 倍	21 日前まで／2 回以内 3 日前まで／3 回以内	24 と 31 U18
	べと病・白斑病・黒斑病	ダコニール1000 ペンコゼブ（ジマンダ イセ）水和剤	1,000 倍 600 倍	7 日前まで／2 回以内 30 日前まで／1 回	M05 M03
ハウレンソ	べと病	ランマンフロアブル ピシロックフロアブル	2,000 倍 1,000 倍	3 日前まで／3 回以内 前日まで／2 回以内	21 U17
ブロッコリー	黒腐病	カスミンボルドー Zボルドー	1,000 倍 500～1,000 倍	7 日前まで／4 回以内 発病前～発病初期／－	24 と M01 M01
ニラ	さび病・白斑葉枯病	アフエットフロアブル ストロビーフロアブル	2,000 倍 3,000 倍	前日まで／2 回以内 前日まで／3 回以内	7 11
	株腐細菌病	Zボルドー	500 倍	発病前～発病初期／－	M01
レタス （非結球レタスを除く）	斑点細菌病・腐敗病	カスミンボルドー カセット水和剤	1,000 倍 1,000 倍	7 日前まで／4 回以内 7 日前まで／2 回以内	24 と M01 24 と 31
	菌核病	アフエットフロアブル スミレックス水和剤	2,000 倍 1,000～2,000 倍	前日まで／3 回以内 7 日前まで／5 回以内	7 2
ヤマノイモ	炭疽病・葉渋病	Zボルドー トップジンM水和剤 ペンコゼブ（ジマンダ イセ）水和剤	500 倍 800 倍 400～600 倍	発病前～発病初期／－ 7 日前まで／5 回以内 21 日前まで／4 回以内	M01 1 M03
野菜類（ゴボウ、サトイモ、オクラなど）		軟腐病など…Zボルドー 500 倍（発病前～発病初期／－）[M01]			
果樹（ナシ、ブドウ、カキ、リンゴなど）		病害虫参考防除例を参照して、予防に努める			

注)分類欄には FRAC コードを記載しました。

3 作物生育の回復対策

台風による強風や大雨で傷んだ葉や根の機能を素早く回復させ、樹勢や生育の立て直しを図るため葉面散布は有効です。

【メリット青（樹勢・草勢回復）、カルタス（体質強化・カルシウム補給）、グリーンセーフプラス（光合成促進・苦土補給）を必要に応じて混用するなどして、葉面散布を行います】

- 農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用してください。
- 宮農 News は J A 全農いばらきホームページでもご覧になれます。