



営農NEWS



農作物への降雹に対する今後の対応について

4月17日午後、県内各地に降雹がありました。現在のところ、降雹のあった地域での露地野菜（キャベツ、ハクサイ、ネギ、レタス、ニンジン、ジャガイモなど）や果樹等に大きな被害発生は確認されていませんが、今後、生育への影響、病害の発生などが懸念される圃場においては、下記を参考に必要に応じて事前の防除に努めてください。

1 露地野菜

降雹による作物へのダメージが大きく、病害の発生が懸念される場合は、使用薬剤の収穫前日数および総使用回数に十分注意して、防除に努めてください。

1) キャベツ

- 軟腐病 … Zボルドー 500 倍（－／－）または
スターナ水和剤 1,000 倍（7 日前まで／3 回以内）
菌核病 … トップジン M 水和剤 1,000～1,500 倍（3 日前まで／2 回以内）または
セイビアーフロアブル 20 1,000 倍（3 日前まで／3 回以内）

2) ハクサイ

- 軟腐病 … Zボルドー 500 倍（－／－）または
スターナ水和剤 1,000 倍（7 日前まで／3 回以内）

3) ネギ

- 軟腐病 … Zボルドー 500 倍（－／－）または
カスミンボルドー 1,000 倍（14 日前まで／2 回以内）または
スターナ水和剤 2,000 倍（7 日前まで／3 回以内）

4) レタス、非結球レタス

- 軟腐病 … Zボルドー 500（－／－）

5) ラッキョウ

- 軟腐病 … Zボルドー 500 倍（－／－）または
スターナ水和剤 1,000 倍（7 日前まで／3 回以内）

6) バレイショ

- 軟腐病 … Zボルドー 500 倍（－／－）または
スターナ水和剤 1,000 倍（7 日前まで／5 回以内）

2 ナシ

ナシの開花期で、花傷みなどの懸念がある場合は、「赤ナシ無袋栽培病害虫参考防除例」に基づき、確実に薬剤防除を実施してください。

なお、参考防除例における殺菌剤は、開花直前～開花始め（4月中旬）にファンタジスタ顆粒水和剤（収穫前日まで／3回以内）、落花期（4月下旬）にスコア顆粒水和剤（収穫14日前まで／3回以内）・ベルコートフロアブル（収穫14日前まで／5回以内）となっています。

農薬使用の際は、必ずラベル及び登録変更に関するチラシ等の記載内容を確認し、飛散に注意して使用して下さい。



生産資材部 営農企画課

電話：029-291-1012 FAX：029-291-1040