JA白山 令和3年産 水稲 (コシヒカリ) 代表的施肥設計

区分		資材名	成分(%) N-P-K	施肥量 (kg/10a)
土作り		白山大地	0-3-0	60kg
基肥	分施	側条003-40 号	10-20-13	30kg
	一発	コシー発くん1号	20-21-13	40~45kg
中間追肥		珪酸加里 プレミア	0-0-20	40kg
穂肥		とれるぞう	15-5-10	30kg

令和3年産 水稲(コシヒカリ)の代表的基本防除暦

11104年 小相(コンピカリ)の「校の基本的际信							
時期		対象	主な対象病害虫	薬剤名			
4月	播種前	種子消毒	いもち病:ごま葉枯病: ばか苗病:もみ枯細菌病: 褐条病:苗立枯細菌病: 苗立枯病(トリコデルマ菌): 苗立枯病(リゾープス菌)	テクリードCフロアブル			
5月	田植前	苗箱施薬	いもち病:もみ枯細菌病: イネクロカメムシ: イネドロオイムシ: イネミズゾウムシ:ウンカ 類:ツマグロヨコバイ: ニカメイチュウ:白葉枯病: フタオビコヤガ	Dr. オリゼフェルテラ粒剤			
	生育初期	水田除草	水田雑草	ソルネット1キロ粒剤 + シリウスエグザ1キロ粒剤			
8月	出穂後①	水田防除	いもち病:ウンカ類: カメムシ類: ツマグロヨコバイ: コブノメイガ: 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	ビームキラップジョーカー粉剤D L			
8月	出穂後②	水田防除	イナゴ類:イネドロオイムシ: ウンカ類:カメムシ類: ツマグロヨコバイ: ニカメイチュウ: フタオビコヤガ	スタークル粉剤DL			

※病害虫の発生状況により、追加防除をすることがあります。

※防除時期は目安です。