

JA加賀  
令和3年産 水稻（コシヒカリ） 代表的施肥設計

区分		資材名	成分(%) N-P-K	施肥量 (kg/10a)
土作り		加賀土元気	0-14-0	100kg
基肥	分施	高度056号	10-25-16	15~30kg
	一発	コシー発くんDX 24	24-14-10	20~35kg
中間追肥		PKけいさん	0-13-11	30kg
穂肥	①	有機入り いしかわライト 550	15-5-10	13~15kg
	②	有機入り いしかわライト 550	15-5-10	13~15kg

令和3年産 水稻（コシヒカリ）の代表的基本防除暦

時期	対象	主な対象病害虫	薬剤名	
4月	播種前	種子消毒	いもち病:ごま葉枯病: ばか苗病:もみ枯細菌病: 褐条病:苗立枯細菌病: 苗立枯病(トリコデルマ菌): 苗立枯病(リゾープス菌)	テクリードCフロアブル
5月	田植前	苗箱施薬	いもち病:もみ枯細菌病: イナゴ類:イネツトムシ: イネドロオウムシ: イネミズゾウムシ:ウンカ類: ニカメイチュウ:白葉枯病	Dr. オリゼフェルテラ粒剤
	生育初期	水田除草	水田雑草	ガンガン1キロ粒剤
7月	出穂前	水田防除	いもち病:ごま葉枯病: ウンカ類:コブノメイガ: ツマグロヨコバイ: 変色米(カーブラリア菌): 穂枯れ(ごま葉枯病菌): 紋枯病:カメムシ類	ノンブラストレバリダ粉剤DL
8月	出穂後①	水田防除	いもち病:イナゴ類: ウンカ類:カメムシ類: ツマグロヨコバイ: 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	ビームスタークル粉剤5DL
	出穂後②	水田防除	カメムシ類	ダントツ粉剤DL

※病害虫の発生状況により、追加防除をすることがあります。  
※防除時期は目安です。