

JA根上
令和3年産 水稻（コシヒカリ） 代表的施肥設計

区分	資材名	成分(%) N-P-K	施肥量 (kg/10a)
土作り	ひやくまん馬力	0-2-0	60kg
基肥	分施	高度056号	35~40kg
	一発	コシー発くん3号	30~40kg
中間追肥	スーパーけい酸	0-3-0	40kg
穂肥	①	有機入り いしかわライト 550	13kg
	②	有機入り いしかわライト 550	13~17kg

令和3年産 水稻（コシヒカリ）の代表的基本防除暦

時期	対象	主な対象病害虫	薬剤名
4月 播種前	種子消毒	いもち病:ごま葉枯病 :ばか苗病:もみ枯細菌病 :褐条病:苗立枯細菌病 :苗立枯病(トリコデルマ菌): 苗立枯病(リゾープス菌)	テクリードCフロアブル
5月	田植前	いもち病:もみ枯細菌病: イネドロオイムシ: イネミズゾウムシ:ウンカ類: ツマグロヨコバイ: ニカメイチュウ:白葉枯病: フタオビコヤガ	Dr. オリゼフェルテラ粒剤
	生育初期	水田除草	水田雑草
7月 出穂前	水田防除	いもち病:ごま葉枯病: 疑似紋枯症(褐色菌核病菌): 疑似紋枯症(褐色紋枯病菌): 疑似紋枯症(赤色菌核病菌): 変色米(カーブラリア菌): 穂枯れ(ごま葉枯病菌): 紋枯病	ノンプラスバリダ粉剤DL
8月 出穂後	水田防除	いもち病:ウンカ類: カメムシ類:ツマグロヨコバイ: コブノメイガ: 穂枯れ(ごま葉枯病菌)	ビームキラップジョーカー粉剤DL

※病害虫の発生状況により、追加防除をすることがあります。
※防除時期は目安です。