JA能美

令和3年産 水稲(コシヒカリ)代表的施肥設計

区分		資材名	成分(%) NーPーK	施肥量 (kg/10a)
土作り		ダイナマイトソイ ル	0−0−0 (ケイ酸25%、苦土2%)	100kg
基肥	分施	高度056号	10-25-16	30 ∼ 40kg
	一発	コシー発くん1号	20-21-13	35~40kg
中間追肥		珪酸加里 プレミア	0-0-20	40kg
穂肥	1	有機入り いしかわライト 550	15–5–10	13kg
	2	有機入り いしかわライト 550	15–5–10	17kg

令和3年産 水稲(コシヒカリ)の代表的基本防除暦

は他の牛性が他(コンピカッ)の「我的生牛奶が信							
時期		対象	主な対象病害虫	薬剤名			
4月	播種前	種子消毒	いもち病:ごま葉枯病: ばか苗病:もみ枯細菌病: 褐条病:苗立枯細菌病: 苗立枯病(トリコデルマ菌): 苗立枯病(リゾープス菌)	テクリードCフロアブル			
5月	田植前	苗箱施薬	いもち病:白葉枯病:もみ枯細菌病:内穎褐変病:穂枯れ(ごま葉枯病菌):イネミズゾウムシ:イネツトムシ:イネドロオイムシ:ニカメイチュウ:フタオビコヤガ:イネヒメハモグリバエ:イナゴ類:ツマグロヨコバイ:イネツトムシ:コブノメイガ	ツインパディート箱粒剤			
	生育初期	水田除草	水田雑草	バッチリLX1キロ粒剤			
7月	出穂前	水田防除	いもち病:ウンカ類: カメムシ類:紋枯病	無人へリ防除			
8月	出穂後	水田防除	ウンカ類:カメムシ類: ツマグロヨコバイ	無人へり防除			

[※]病害虫の発生状況により、追加防除をすることがあります。

[※]防除時期は目安です。