

JAおおぞら
令和3年産 水稲（コシヒカリ）代表的施肥設計

区分	資材名	成分(%) N-P-K	施肥量 (kg/10a)	
土作り	能登にやさしい 土づくり	0-5-0	45kg	
基肥	分施	高度056号	20~28kg	
	一発	有機入り 能登コシー発 または けい酸パワー・ コシー発くん	20-15-11 10-15-12	20~30kg 50kg
		または ケイ酸入り 里山の香	13-7-6	38~45kg
中間追肥	PKけいさん	0-13-11	40kg	
穂肥	分施	能登みのり	15-4-8	10~15kg × 2回
		有機入り能登 穂肥一発	15-4-8	20~30kg

令和3年産 水稲（コシヒカリ）の代表的基本防除暦

時期	対象	主な対象病害虫	薬剤名
4月 播種前	種子消毒	いもち病:ごま葉枯病:ばか 苗病:もみ枯細菌病: 褐条病:苗立枯細菌病:苗立 枯病(トリコデルマ菌): 苗立枯病(リゾープス菌)	タフブロック
5月	田植時	いもち病:イネドロオイムシ: イネミズゾウムシ: フタオビコヤガ: もみ枯細菌病: ツマグロヨコバイ:白葉枯病: ニカメイチュウ	Dr. オリゼフェルテラ粒剤
	生育初期	水田除草	水田雑草
7月 出穂前	水田防除	いもち病:ごま葉枯病: ウンカ類:コブノメイガ: ツマグロヨコバイ: 変色米(カーブラリア菌): 穂枯れ(ごま葉枯病菌): 紋枯病:カメムシ類	トレバリダビーム紛剤DL
8月 出穂後	水田防除	いもち病:ウンカ類: カメムシ類	ラブサイドキラップ粉剤DL

※病害虫の発生状況により、追加防除をすることがあります。
※防除時期は目安です。