

JA志賀
令和3年産 水稻（コシヒカリ）代表的施肥設計

| 区分 | 資材名 | 成分(%) N-P-K | 施肥量 (kg/10a) |
|------|---------------------|-----------------------|-----------------|
| 土作り | 能登にやさしい 土づくり | 0-5-0 | 45kg |
| 基肥 | 分施 | 高度056号 | 20~28kg |
| | 一発 | 有機入り 能登コシー発 または | 20-15-11 |
| | 一発 | けい酸パワー コシー発君 | 10-15-12 |
| 中間追肥 | PKけいさん | 0-13-11 | 40kg |
| 穂肥 | ① 有機入り 能登穂肥一発 | 15-4-8 | 20~30kg |

令和3年産 水稻（コシヒカリ）の代表的基本防除暦

| 時期 | 対象 | 主な対象病害虫 | 薬剤名 |
|-----------|------|---|---------------------|
| 4月 播種前 | 種子消毒 | いもち病: ばか苗病: もみ枯細菌病: 褐条病: 苗立枯細菌病 : 苗立枯病(トリコデルマ菌): 苗立枯病(リゾープス菌) | タフブロック |
| 5月 | 田植前 | いもち病: 白葉枯病: イネミズ ゾウムシ: イネツトムシ: イネドロオイムシ : ニカメイチュウ : フタオビコヤガ | Dr.オリゼフェルテラ粒剤 |
| | 生育初期 | 水田除草 | 水田雑草 アツパレZ 1キロ粒剤 |
| 7月 出穂前 | 水田防除 | いもち病: ウンカ類: コブノメイガ: ツماغロヨコバイ: 穂枯れ(ごま葉枯病菌): 紋枯病: カメムシ類 | トレバリダビーム粉剤DL |
| 8月 出穂後 | 水田防除 | いもち病: ウンカ類: カメムシ類 | ラブサイドキラップ粉剤DL |

※病害虫の発生状況により、追加防除をすることがあります。
※防除時期は目安です。