

ジエイフレンド[®]

1キロ粒剤・フロアブル・ジャンボ

® : JA全農の登録商標

田植同時も、
(1キロ粒剤)
直播水稻も
(1キロ粒剤、フロアブル)
OK!

後発のノビエも
長く抑える!

難防除雑草
に強い!

ホタルイも
しっかり枯らす!



いざ、問題雑草退治!



アゼナ

クサネム

クログワイ

ウリカワ

イボクサ

しつこいソビエはもちろん、ホタルイ・コナギ、SU抵抗性雑草にもしっかりと効果を発揮!

- ①後発のノビエの発生を長く抑制します。
- ②難防除雑草(オモダカ、クログワイ)や、SU抵抗性雑草に高い効果を発揮します。
- ③クサネム、イボクサ、タウコギ等の特殊雑草にも優れた効果を示します。
- ④効果の発現が非常に速く、長期間持続します。

適用雑草の範囲及び使用方法

*毒物及び劇物に該当しないものを指す

ジェイフレンド 1キロ粒剤

■登録番号 第23844号 ■有効成分(一般名)オキサジクロメホン:0.3% テフリルトリオン:3.0% ピラクロニル:2.0% ■人畜毒性:普通物*

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 総使用回数 | 使用方法 | 雑草名 | 散布適期 |
|------|--|--------------------------------------|---------|--|---|--------------------------------------|--|
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 及び マツバヤ、ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ、ウリカワ オモダカ、クログワイ ヒルムシロ、セリ | 移植時 | 1kg/10a | 本剤 1回 オキサジクロメホン剤 2回 テフリルトリオン剤 2回 ピラクロニル剤 2回 | 田植同時 散布機で施用 温水散布 又は 無人ヘリコプターによる散布 | ノビエ | 3葉期まで(直播:2.5葉期まで) |
| | 移植直後~ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで | | | | | ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ | 3葉期まで(直播:2葉期まで) |
| 直播水稲 | 水田一年生雑草 及び マツバヤ、ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ、ウリカワ ヒルムシロ、セリ | 稻1葉期~ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫60日前まで | | | | ウリカワ オモダカ クログワイ ヒルムシロ セリ | 3葉期まで(直播:1葉期まで) 発生前~発生始期まで 発生期まで 再生前~再生始期まで |

ジェイフレンド フロアブル

■登録番号 第23845号 ■有効成分(一般名)オキサジクロメホン:0.57% テフリルトリオン:5.7% ピラクロニル:3.8% ■人畜毒性:普通物*

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 総使用回数 | 使用方法 | 雑草名 | 散布適期 |
|------|--|--------------------------------------|---------------|--|------------------|----------------------------------|---|
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 及び マツバヤ、ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ、ウリカワ オモダカ、クログワイ ヒルムシロ、セリ | 移植後5日~ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで | 500ml/ 10a | 本剤 1回 オキサジクロメホン剤 2回 テフリルトリオン剤 2回 ピラクロニル剤 2回 | 原液湛水散布 又は水口施用 | ノビエ | 3葉期まで(直播:2.5葉期まで) |
| | 移植後30日まで | | | | | ミズガヤツリ ホタルイ ウリカワ ヘラオモダカ | 4葉期まで(直播:3葉期まで) 3葉期まで(直播:2葉期まで) 3葉期まで |
| 直播水稲 | 水田一年生雑草 及び マツバヤ、ホタルイ ミズガヤツリ、ウリカワ ヒルムシロ、セリ | 稻1葉期~ ノビエ2.5葉期 但し、 収穫90日前まで | | | | オモダカ クログワイ ヒルムシロ セリ | 発生前~発生始期まで 発生期まで 再生前~再生始期まで |

ジェイフレンド ジャンボ

■登録番号 第23924号 ■有効成分(一般名)オキサジクロメホン:0.75% テフリルトリオン:7.5% ピラクロニル:5.0% ■人畜毒性:普通物*

| 作物名 | 適用雑草名 | 使用時期 | 使用量 | 総使用回数 | 使用方法 | 雑草名 | 散布適期 |
|------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|--|
| 移植水稲 | 水田一年生雑草 及び マツバヤ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ ヒルムシロ セリ | 移植後5日~ ノビエ3葉期 但し、 移植後30日まで | 小包装 (パック) 10個 (400g) /10a | 本剤 1回 オキサジクロメホン剤 2回 テフリルトリオン剤 2回 ピラクロニル剤 2回 | 水田に小包装 (パック) のまま 投げ入れる | ノビエ ホタルイ ヘラオモダカ ミズガヤツリ ウリカワ ミズアオイ ヒルムシロ セリ | 3葉期まで 3葉期まで 2葉期まで 発生期まで 再生前~再生始期まで |

使用上の注意事項(一部抜粋)

3剤に共通する注意事項

- 本剤は雑草の発生前から生育初期に有効なので、ノビエの3葉期までに時期を失しないように散布してください。なお、多年生雑草は生育段階によって効果にフレが出るので、必ず適期に散布するように注意してください。
- 砂質土壤の水田および漏水田(減水深2cm/日以上)、軟弱な苗を移植した水田、極端な浅植えをした水田および浮き苗の多い水田では葉害が発生するおそれがあるので使用をさせてください。
- 稻の根が露出する条件では葉害が生じるおそれがあるので注意してください。
- 苗の植え付けが均一になるよう、代かき、均平作業および植え付けはていねいに行ってください。また、未熟有機物を施用した場合は、特にていねいに行ってください。
- 本剤はその殺草特性から、いぐさ、れんこん、せり、くわいなどの生育を阻害するおそれがあるので、これらの作物の生育期に隣接田で使用する場合は十分注意してください。
- いぐさ栽培予定水田では使用しないでください。
- 本剤を使用した水田の田面水は、他の作物の灌水に用いてください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らぬように注意するほか、別途提供されている技術情報も参考にして使用してください。特に初めて使用する場合や異常気象の場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 水産動植物(藻類)に影響を及ぼすので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。
- 散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

1キロ粒剤の注意事項

- 散布に当たっては、水の出入りを止め湛水状態(水深3~5cm)で均一に散布してください。本剤散布後、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。

- ごくまれに水稲に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展していくので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

フロアブルの注意事項

- 使用前に容器を軽く振ってください。
- 散布に当たっては水の出入りを止め湛水状態(水深3~5cm)で本剤が水田全面にいきわたるように散布してください。本剤散布後、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。

- 本剤が多量に稻体に付着した場合に、付着した葉ならびに直後に伸展していく新葉1~2枚に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展していくので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。なお、ノズル散布をした場合、白化症状が強く出ることがあります。

ジャンボの注意事項

- 散布に当たっては水の出入りを止め5~6cmの湛水状態に保ってください。本剤散布後、少なくとも3~4日間は通常の湛水状態を保ち、散布後7日間は落水、かけ流しはしないでください。
- パックに使用しているフィルムは水溶性なので、ぬれた手で作業したり、降雨で破袋することがないようにしてください。
- 藻や浮き草が多発している水田では、拡散が不十分となり部分的な葉害や効果不足を生じることがあるので使用をさせてください。
- 拡散が不十分な場合などに、まれに水稲に白化症状が認められる場合があります。しかしながら、その後は正常な葉が伸展していくので、生育に影響を及ぼすことはほとんどありません。
- 本剤は水溶性フィルムで小包装化されているため、ぬれた手で触らないでください。
- 水溶性フィルム包装が破損した場合は以下の点に注意してください。

眼に対して刺激性があるので、眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

*本資料の記載内容は2017年9月現在の登録内容に基づいています。

★使用前にはラベルをよく読んでください。★ラベルの記載以外には使用しないでください。★本剤は小児の手の届くところには置かないでください。★空袋・空容器は圃場などに放置せず、適切に処理してください。



JAグループ
農 協 | 全 農 | 経 済 連
全農は登録商標 第4702318号



協友アグリ株式会社
東京都中央区日本橋小網町6-1
<http://www.kyoyu-agri.co.jp>