



速く効く。
あの害虫にも効く。
だから、
収量に差がつく。



無処理 残葉率 0%



A剤 残葉率 20%



グレーシア乳剤 残葉率 90%

食害される前に駆除できる。*

野菜・
茶用
殺虫剤

グレーシア[®]乳剤



- 有効成分フルキサメタミド配合。
抵抗性コナガにも卓効
- 葉内に薬剤が浸透、葉裏の害虫も退治
- 幅広いチョウ目害虫に効果
- 殺虫効果は約2週間持続



*1 作物によって適用害虫は異なります。詳しくは裏面をご覧ください。

*2 効果は害虫の発生密度や天候、栽培環境等によって異なる場合があります。

※ グレーシア乳剤のハスモンヨトウ終齢幼虫に対する速効性試験 2018年日産化学生物科学研究所（社内試験）【試験方法】虫体浸漬、処理1時間後餌入、20時間後撮影

速く効く。あの害虫にも効く。 グレーシア[®] 乳剤

農林水産省登録 第24185号 有効成分 フルキサメタミド…10.0% 人畜毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指すという通称） 容量：250ml入、500ml入

グレーシアは、「効きの速さ」と「対象害虫の幅広さ」を兼ね備えた野菜・茶用殺虫剤です。

POINT

01

効きの速さ

害虫の口だけでなく、皮膚からも吸収されるから、作物が食べられる前*に駆除できる。

*グレーシアの速効性については、右の試験写真をご覧ください。

POINT

02

対象害虫の幅広さ

チョウ目害虫やアザミウマなど幅広い害虫*に卓効。

*作物によって適用害虫は異なります。詳しくは下の表をご覧ください。

■ 速く効くから、収量に差がつかます。



2021年日産化学生物科学研究所（社内試験）
【試験方法】ハスモンヨトウ終齢幼虫 虫体散布2.5ml / ジャーレ、処理1時間後餌入、23時間後撮影

適用害虫と使用方法 使い方 散布（ゆりは30分間種球浸漬）

*本剤及びフルキサメタミドを含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量 (1/10a)	使用時期	総使用回数*
さといも	ハスモンヨトウ	2000～3000倍	100～300L	収穫7日前まで	2回以内
かんしょ	ナカジロシタバ、ハスモンヨトウ、コナジラミ類、ハダニ類				
だいこん	コナガ、アオムシ、ハイマダラノメイガ、カブラハバチ、キスジノミハムシ				
はくさい	コナガ、アオムシ、ハスモンヨトウ、ヨトウムシ、ハイマダラノメイガ、オオタバコガ、ネギアザミウマ				
キャベツ	コナガ、アオムシ、ウワバ類、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、アザミウマ類、ハイマダラノメイガ				
カリフラワー	コナガ、アオムシ、ネギアザミウマ、ハスモンヨトウ				
ブロッコリー	コナガ、アオムシ、ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、ウワバ類、オオタバコガ、ハイマダラノメイガ、ネギアザミウマ				
レタス、非結球レタス	ヨトウムシ、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ナモグリバエ、アザミウマ類	2000倍		収穫3日前まで	
	シロイチモジヨトウ				
たまねぎ	ネギハモグリバエ	2000～3000倍		収穫7日前まで	
ねぎ	ネギアザミウマ				
トマト、ミニトマト	ハスモンヨトウ、オオタバコガ、コナジラミ類、アザミウマ類、 トマトサビダニ、ハモグリバエ類	2000倍	100～300L	収穫前日まで	
ピーマン	オオタバコガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、チャノホコリダニ				
なす	コナジラミ類、アザミウマ類、ハダニ類、チャノホコリダニ、 ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハモグリバエ類				
きゅうり	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、ウリノメイガ、ハダニ類、コナジラミ類、ハモグリバエ類				
すいか	オオタバコガ、ウリノメイガ、アザミウマ類、コナジラミ類、ハダニ類、ハスモンヨトウ	2000～3000倍	200～400L	摘採14日前まで	
メロン	アザミウマ類、コナジラミ類、ウリノメイガ、ハダニ類、ハモグリバエ類				
だいず	マメシンクイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、 ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ				
豆類（未成熟、ただし、えだまめを除く）	ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類				
えだまめ	マメシンクイガ、ハスモンヨトウ、ハモグリバエ類、 ウコンノメイガ、オオタバコガ、フタスジヒメハムシ	2000倍		収穫前日まで	
いちご	アザミウマ類、ハスモンヨトウ、オオタバコガ、ハダニ類				
茶	チャノコカクモンハマキ、チャハマキ、チャノキイロアザミウマ、チャノミドリヒメコバイ、 マダラカサハラハムシ、ヨモギエダシヤク、チャノホソガ、チャツゲコナジラミ	2000倍	200～400L	摘採14日前まで	1回
		サビダニ類、チャノホコリダニ			
きく	ハスモンヨトウ、ハダニ類、オオタバコガ、アザミウマ類	2000倍	100～300L	発生初期	2回以内
りんどう	リンドウホソハマキ、ハダニ類、アザミウマ類				
ゆり	ネダニ類				
			-	植付前	1回

使用上の注意事項（抜粋）

- 天敵類に影響があるので使用に際しては注意してください。●水なす、賀茂なすの果実には薬害を生じるので、使用しないでください。
- 使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。

最新の
製品情報は
こちら



本資料は2021年7月現在の登録内容に基づいています。



日産化学株式会社

東京都中央区日本橋二丁目5番1号
ホームページ <https://www.nissan-agro.net/>
お客様窓口 TEL.03-4463-8271（9:00～17:30 土日祝日除く）