

JA仙台

出荷先を○で囲んでください 1.市場 2.インショップ 3.たなばたけ

栽培曆

＜品名 ねぎ ＞（圃場別・品種別に作成してください）

※リーキ、小ねぎを含む。 登録作物名:ねぎ・野菜類

＜栽培内容＞

(品種名: 夏扇¹⁹⁷ -)

確認月日:令和 7年8月24日

支店名		生産工程管理担当者	
生産者名			
生産者住所		TEL	— —
播種日	令和 6 年 2 月 28 日	定植日	令和 6 年 5 月 2 日
出荷予定期間	11 月 1 日 ~ 2 月 28 日	作付地番	40-1239、44、45
			作付面積 2.3 ㌥

＜土づくり日誌＞使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書きください。

月 日	肥料・資材名	保証成分(窒素—磷酸—加里)	肥料(施用量(kg))
5月2日	らくま3	14、10、10	80
5月2日	起微生物		30
以降	らくま3	14、10、10	10×3回

＜防除日誌＞使用した農薬をすべてお書きください。

(令和6年4月1日現在登録)

区 分		使用資材	使用基準			使用月日を下記に記入					
		薬 剤 名	希釈倍率 又は使用量	使用時期	回 数	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
殺 虫 剤	劇	ハチハチ乳剤 (アブラムシ・アザミウマ)	1,000倍	収穫7日前迄	2	4/26					
	劇	ダイアジノン乳剤40 (アザミウマ・タネネギバエ)	700倍	収穫21日前迄	2						
		フレオフロアブル (シロイデモジヨトウ)	1,000倍	収穫3日前迄	4						
	劇	ランネット45DF (ネギアザミウマ類)	1,000倍	収穫7日前迄	4						
	劇	モスピラン水溶液 (アザミウマ)	2,000倍	収穫7日前迄	3						
		スピノエース顆粒水和剤 (シロイデモジヨトウ)	5,000倍	収穫3日前迄	3	6/20					
	劇	アグロスリン乳剤 (アザミウマ・アブラムシ類)	2,000倍	収穫7日前迄	5						
		アファーム乳剤 (アザミウマ・ハモグリバエ)	1,000倍	収穫7日前迄	3						
		ダントツ粒剤 (タネバエ・ネギアザミウマ)	6kg/10a	収穫3日前迄	4						
		ウララDF (ネギアザミウマ)	1,000倍	収穫前日迄	3						
		ベネビアOD (アザミウマ・ハモグリバエ)	2,000倍	収穫前日迄	3	6/2	10/30				
		ダントツ SC	5000倍	収穫前日迄	2	10/2					
	グレース	3000倍	収穫7日前迄	2	7/12	5/24					
殺 菌 剤		モンカップロアフル40 (白絹病)	2,000倍	土寄せ時 (収穫30日前迄)	4						
		オンリーワンフロアブル (さび病・黒斑病)	1,000倍	収穫14日前迄	3						
		テーク水和剤 (さび病・べと病・葉枯病・黒斑)	600倍	収穫14日前迄	3						
		リドミルゴールドMZ (べと病)	1,000倍	収穫14日前迄	3						
		アミスター20フロアブル (さび病・白班葉枯病)	2,000倍	収穫3日前迄	4	7/12					
		ストロビーフロアブル (さび病・黒斑病・黄斑病)	2,000倍	収穫7日前迄	3						
		ロブラール水和剤 (小苗根腐敗病・黒斑病)	1,000倍	収穫14日前迄	3						
		オリゼメート粒剤 (軟腐病)	6kg/10a	土寄せ時 (収穫30日前迄)	2						
		ヨネボシ水和剤 (べと病・さび病・軟腐病)	500倍	収穫7日前迄	4						
		カスミンポルドル (軟腐病)	1,000倍	収穫14日前迄	2						
		ダウニー10 1000	1000倍	収穫14日前迄	3	6/20					
	除 草 剤		グラマックス水和剤 (1年生雑草)	150g/10a	定植後播種後～ 収穫30日前迄	1					
		ナブ乳剤 (1年生イネ科雑草)	200ml/10a	収穫30日前迄	1	6/14					
		ゴーゴーサン細粒剤F (1年生雑草)	6kg/10a	定植後～定植10日後迄	1	5/9					
		ロックス (1年生広葉雑草)	150g/10a	定植30日後以降 収穫30日前迄	1						
毒		ブリグロックスL (1年生雑草)	1,000ml/10a	播種又植付前	3						
確認者覧		営農センター課長			生産工程管理責任者						