

JA仙台

栽培暦

<品名 きゅうり>

出荷先を○で囲んでください 1.市場 2.インショップ 3.たなばたけ

> (園場別・品種別に作成してください)

登録作物名:きゅうり・うり科野菜類・野菜類

<栽培内容>

(品種名:)

確認月日:令和 6 年 6 月 28 日

支店名	宮城	生産工程 管理担当者	
生産者名		TEL	—
生産者住所			
播種日	令和 6 年 3 月 20 日	定植日	令和 6 年 5 月 10 日
出荷予定期間	7 月 1 日 ~ 月 日	作付地番	大勝草刈
		作付面積	1 a

<土づくり日誌>使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書きください。

月 日	肥料・資材名	保証成分(窒素—磷酸—加里)	肥料(施用量(kg))
3/10	堆肥 やせう専用 604	16-16-14	10
5/3	ケムリン		20

<防除日誌>使用した農薬をすべてお書きください。

(令和6年4月1日現在登録)

区 分	使用資材		使用基準		使用月日を下記に記入					
	薬 剤 名	希釈倍率 又は使用量	使用時期	回 数	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	6回目
殺 虫 剤	ダイアジノン粒剤5 (ネキリムシ類・タネバエ)	6kg/10a	播種時又は定植時	2	5/10					
	アドマイヤー1粒剤 (アブラムシ・コナジラミ)	2g/株	定植時	1						
	アファーム乳剤 (コナジラミ・アザミウマ)	2,000倍	収穫前日迄	2	6/10					
	コテツフロアブル (ハダニ・ウリハムシ)	2,000倍	収穫前日迄	3						
	アグロスリン乳剤 (ミナミキイロアザミウマ)	1,000倍	収穫前日迄	5	6/20					
	カスタード乳剤 (トマトハモグリバエ)	2,000倍	収穫前日迄	4						
	センタリー顆粒水和剤 (アオムシ・コナガ・ヨトウムシ)	1,000倍	発生初期～ 収穫前日迄	—						
	モスピラン水溶液 (ウリノメイガ・コナジラミ類)	2,000倍	収穫前日迄	3						
	ダントツ水溶液 (アブラムシ・コナジラミ)	2,000倍	収穫前日迄	3						
	ダントツフロアブル (ハダニ類)	2,000倍	収穫前日迄	1						
殺 菌 剤	グレース乳剤 (ハモグリバエ・ネギコガ)	2,000倍	収穫7日前迄	2						
除 草 剤	ベルグート水和剤 (うどんこ病・褐斑病・炭疽病)	2,000倍	収穫前日迄	7						
	スミレックス水和剤 (菌核病・つる枯病・灰色かび)	1,000倍	収穫前日迄	6						
	デーケ水和剤 (うどんこ病・褐斑病・べと病)	600倍	収穫前日迄	3	6/10					
	アミスター20フロアブル (うどんこ病・べと病・菌核病)	1,500倍	収穫前日迄	4						
	ダコニール1000 (褐斑病・べと病・黒星病)	1,000倍	収穫前日迄	12	6/25					
	ゲッター水和剤 (灰色かび病・褐斑病・炭疽病)	1,500倍	収穫前日迄	5						
	カンタストライフロアブル (灰色かび病・菌核病)	1,000倍	収穫前日迄	3						
	ドリフミン水和剤 (うどんこ病・黒星病)	3,000倍	収穫前日迄	5						
毒	エイトアップ液剤 (1年生雑草)	500ml/10a	耕起7日前迄	1						
	クレマート乳剤 (1年生雑草)	400ml/10a	定植前・雑草発生前	1						
	トレファノサイド粒剤2.5 (1年生雑草)	4kg/10a	定植前(植穴掘前)	1						
	バスタ液剤 (1年生雑草)	500ml/10a	雑草生育期畦間処理 収穫前日迄	3						
	ブリクロックスL (1年生雑草)	1,000ml/10a	播種前又は植付前	3						
確認者覧	営農センター課長			印	生産工程管理責任者					