

JA仙台

栽培暦

&lt;品名 きゅうり &gt;

出荷先を○で囲んでください 1.市場 2.インショップ 3.たなばたけ

(圃場別・品種別に作成してください)

登録作物名:キュウリ・うり科野菜類・野菜類

&lt;栽培内容&gt;

(品種名: )

確認月日:令和5年6月29日

|        |             |               |           |
|--------|-------------|---------------|-----------|
| 支店名    | 宮城支店        | 生産工程<br>管理担当者 |           |
| 生産者名   |             |               |           |
| 生産者住所  | 仙台市         | TEL           | 394-6403  |
| 播種日    | 令和5年4月10日   | 定植日           | 令和5年5月15日 |
| 出荷予定期間 | 6月30日~8月25日 | 作付地番          |           |
|        |             | 作付面積          | 0.30a     |

&lt;土づくり日誌&gt;使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書きください。

| 月 日  | 肥料資材名        | 保証成分 (総窒素-リン酸-加里) | 肥料 (施用量(kg)) |
|------|--------------|-------------------|--------------|
| 4/20 | 堆肥 苦土ケイ酸 20k |                   | 1t           |
| 5/10 | 野菜専用 20k     |                   |              |
| 6/20 | S604 20k     |                   |              |

&lt;防除日誌&gt;使用した農薬をすべてお書きください。

(令和4年4月1日現在登録)

| 区分   |    | 使用資材          | 使用基準          |          |    | 使用月日を下記に記入 |     |     |     |     |     |
|------|----|---------------|---------------|----------|----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|      |    | 薬剤名           | 希釈倍率<br>又は使用量 | 使用時期     | 回数 | 1回目        | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
| 殺虫剤  |    | アフーム乳剤        | 2,000倍        | 収穫前日迄    | 2  | 5/25       |     |     |     |     |     |
|      |    | アドマイヤー1粒剤     | 2g/株          | 定植時      | 1  |            |     |     |     |     |     |
|      |    | コテツフロアブル      | 2,000倍        | 収穫前日迄    | 3  |            |     |     |     |     |     |
|      |    | アグロスリン乳剤      | 1,000倍        | 収穫前日迄    | 5  | 5/30       |     |     |     |     |     |
|      |    | ダイアジノン粒剤5     | 6kg/10a       | 播種時又は定植時 | 2  | 5/15       |     |     |     |     |     |
|      |    | カスケード乳剤       | 2,000倍        | 収穫前日迄    | 4  |            |     |     |     |     |     |
|      |    | ゼンターリ顆粒水和剤    | 1,000倍        | 収穫前日迄    | -  |            |     |     |     |     |     |
|      |    | モスピラン水溶剤      | 2,000倍        | 収穫前日迄    | 3  | 6/15       |     |     |     |     |     |
|      |    | ダントツ水溶剤       | 2,000倍        | 収穫前日迄    | 3  |            |     |     |     |     |     |
|      |    | ダニトンフロアブル     | 2,000倍        | 収穫前日迄    | 1  |            |     |     |     |     |     |
| 殺菌剤  |    | ベルコート水和剤      | 2,000倍        | 収穫前日迄    | 7  |            |     |     |     |     |     |
|      |    | スミレックス水和剤     | 1,000倍        | 収穫前日迄    | 6  |            |     |     |     |     |     |
|      |    | テーク水和剤        | 600倍          | 収穫前日迄    | 3  | 5/25       |     |     |     |     |     |
|      |    | アミスター207DF    | 1,500倍        | 収穫前日迄    | 4  | 6/10       |     |     |     |     |     |
|      |    | ダコニール1000     | 1,000倍        | 収穫前日迄    | 8  | 5/20       |     |     |     |     |     |
|      |    | ゲッター水和剤       | 1,500倍        | 収穫前日迄    | 5  |            |     |     |     |     |     |
|      |    | カンタスドライフロアブル  | 1,000倍        | 収穫前日迄    | 3  |            |     |     |     |     |     |
|      |    | トリフミン水和剤      | 3,000倍        | 収穫前日迄    | 5  |            |     |     |     |     |     |
|      |    |               |               |          |    |            |     |     |     |     |     |
|      |    |               |               |          |    |            |     |     |     |     |     |
| 除草剤  | 露地 | トレファノサイド粒剤2.5 | 4kg/10a       | 定植前      | 1  |            |     |     |     |     |     |
|      |    | ブリグロックスL      | 1,000ml/10a   | 播種前又は植付前 | 3  |            |     |     |     |     |     |
|      |    |               |               |          |    |            |     |     |     |     |     |
|      |    |               |               |          |    |            |     |     |     |     |     |
| 確認者覧 |    | 営農センター課長      |               |          |    | 生産工程管理責任者  |     |     |     |     |     |

露地=露地栽培のみ