

JA仙台

栽培歴

出荷先を○で囲んでください 1.市場 2.インショップ 3.たなばたけ

&lt;品名 小松菜&gt;

&lt;(圃場別・品種別に作成してください)&gt;

登録作物名:小松菜・非結球アブラナ科・野菜類

&lt;栽培内容&gt;

&lt;品種名&gt;

確認月日:令和 年 月 日

|        |                 |               |           |
|--------|-----------------|---------------|-----------|
| 支店名    | 西多賀             | 生産工程<br>管理担当者 |           |
| 生産者名   |                 | TEL           |           |
| 生産者住所  |                 |               |           |
| 播種日    | 令和 6 年 10 月 7 日 | 定植日           | 令和 年 月 日  |
| 出荷予定期間 | 11 月 12 日 ~ 月 日 | 作付地番          | 作付面積 20 a |

&lt;土づくり日誌&gt; 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書きください。

| 月 日   | 肥料・資材名  | 保証成分(窒素—燐酸—加里) | 肥料(施用量(kg)) |
|-------|---------|----------------|-------------|
| 11月8日 | こたまり403 | 14-10-13       | 15          |
|       |         |                |             |
|       |         |                |             |
|       |         |                |             |

&lt;防除日誌&gt; 使用した農薬をすべてお書きください。

(令和6年4月1日現在登録)

| 区 分         |    | 使用資材                          | 使用基準          |                 |     | 使用月日を下記に記入 |     |     |     |     |     |
|-------------|----|-------------------------------|---------------|-----------------|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|             |    | 薬 剤 名                         | 希釈倍率<br>又は使用量 | 使用時期            | 回 数 | 1回目        | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 |
| 殺<br>虫<br>剤 |    | ダイアリン水剤<br>(ネキリムシ・キスジノミハムシ)   | 6kg/10a       | 播種時又定植時         | 1   | 10/7       |     |     |     |     |     |
|             | 劇  | アグロシリン水剤<br>(アブラムシ)           | 2,000倍        | 収穫前日迄           | 2   | 11/4       |     |     |     |     |     |
|             | 劇  | フォース水剤<br>(ネキリムシ・キスジノミハムシ)    | 4kg/10a       | 播種前             | 1   |            |     |     |     |     |     |
|             | 劇  | ネオダラン水剤<br>(アブラムシ・キスジノミハムシ)   | 4,000倍        | 収穫7日前迄          | 1   |            |     |     |     |     |     |
|             |    | アブタム水剤<br>(コナガ)               | 2,000倍        | 収穫3日前迄          | 2   |            |     |     |     |     |     |
|             |    | スロフェース水和剤<br>(アオムシ・コナガ・アザヒクマ) | 2,500倍        | 収穫14日前迄         | 2   |            |     |     |     |     |     |
|             | 劇  | コデツプロアブル<br>(アオムシ・ハクサイダニ)     | 2,000倍        | 収穫3日前迄          | 1   |            |     |     |     |     |     |
|             |    | カスケード水剤<br>(アオムシ・ハマキグリバエ)     | 2,000倍        | 収穫7日前迄          | 2   |            |     |     |     |     |     |
|             | BT | センタリー水和剤<br>(ヨトウムシ・アオムシ・コナガ)  | 1,000倍        | 発生初期～<br>収穫前日迄  | —   |            |     |     |     |     |     |
|             |    | アグロシリン水剤<br>(アブラムシ)           | 6kg/10a       | 播種時             | 1   |            |     |     |     |     |     |
| 殺<br>菌<br>剤 |    | ジーフアイン水和剤<br>(うどんこ・白さび・灰かび病)  | 1,000倍        | 収穫前日迄           | —   |            |     |     |     |     |     |
|             |    | ハーモスト水和剤<br>(うどんこ・さび・灰かび病)    | 800倍          | 収穫前日迄           | —   |            |     |     |     |     |     |
|             |    | アミスター20フロアブル<br>(白さび・白班病)     | 2,000倍        | 収穫7日前迄          | 2   |            |     |     |     |     |     |
|             |    | ランランフロアブル<br>(白さび病)           | 2,000倍        | 収穫3日前迄          | 3   |            |     |     |     |     |     |
|             |    | ホビジン粉剤<br>(うどんこ病)             | 20kg/10a      | 播種時又定植時         | 1   |            |     |     |     |     |     |
|             |    | 2剤ルード<br>(軟腐病・べと病・黒腐病・細菌)     | 500倍          | —               | —   |            |     |     |     |     |     |
|             |    |                               |               |                 |     |            |     |     |     |     |     |
|             |    |                               |               |                 |     |            |     |     |     |     |     |
|             |    |                               |               |                 |     |            |     |     |     |     |     |
|             |    |                               |               |                 |     |            |     |     |     |     |     |
| 除<br>草<br>剤 |    | タチタツシ10<br>(1年生雑草)            | 500ml/10a     | 播種7日以前<br>雑草生育期 | 1   |            |     |     |     |     |     |
|             |    | トリファンサイド水剤<br>(1年生雑草)         | 200ml/10a     | 播種直後            | 1   |            |     |     |     |     |     |
|             |    | ナブ水剤<br>(1年生イネ科雑草)            | 200ml/10a     | 雑草生育期<br>収穫7日前迄 | 1   |            |     |     |     |     |     |
|             |    | ラッパール水剤<br>(1年生雑草)            | 100ml/10a     | 播種直後            | 1   |            |     |     |     |     |     |
|             |    |                               |               |                 |     |            |     |     |     |     |     |

確認者

営農センター課長

生産工程管理責任者