

令和6年産「加美よつば大豆」生産履歴カード

JA加美よつば

(生産者番号)	生産者氏名	生産者住所	TEL
()			

○品種別作付面積

品種名	作付面積(㌘)	種子更新		播種量 (kg/10a)	播種月日	中耕培土	収穫月日	収穫方法	乾燥調製方法
		購入	自家						
タンレイ				30kg	6月8日	7月16日	11月15・16日	コンバイン・その他	JA委託(自己)
								コンバイン・その他	JA委託・自己

○肥料・土壌改良剤の使用状況

項目	肥料商品名	使用月日	使用量 (kg/10a)	保証成分(%)			
				窒素	燐酸	加里	
有機物・土壌改良資材等	完熟堆肥		t				
	エコ堆くん		t				
	ネガポン	5月26日	10g	kg	種子重量の0.3%約衣		
	苦土石灰(粒)サイコー		kg		Mg10%	7%加55%	
	地力の素ペレット		kg		Ph6.7	有機物78.7%	腐食酸30.2%
基肥	豆化成S550号		kg	5	15	20	
	大豆専用一発522号		kg	15	12	12	
	大豆一発くん577	6月26日	30	kg	25	7	7
	大豆一発号R500		kg	25	10	10	
	大豆一発号R707		kg	27	10	7	
追肥	LPコート40		kg	40			
			kg				
吸収抑制対策	塩化加里		kg			60.5	
	バームアッシュ		kg			30	

○農薬使用状況

対象病害虫(使用目的)	農薬商品名	使用月日	薬剤散布量			防除基準		
			(10a当たり)			(きちんと守りましょう！)		
			使用量	希釈	回数	※使用時期	※10a使用基準	使用回数
殺虫・殺菌剤	クルーザーMAXX	5月26日	8g/乾燥種子	1kg		播種前	0.8%種子粉衣	
種子消毒	キヒゲンR-2フロアブル		20g/乾燥種子	1kg		播種前	2%種子粉衣	
	キヒゲン		10g/乾燥種子	1kg		播種前	1%種子粉衣	
除草	ラクサー乳剤	5月26日	600	ml/10a	100ㇿ	播種後～発芽前	400～800ml、100ㇿ	1回
	フルミオWDG			g/10a		播種後～発芽前	5～10g、100ㇿ	1回
	フィールドスター乳剤			ml/10a		播種後～発芽前	75～150ml、70～150ㇿ	1回
	ザクザ液剤			ml/10a		収穫28日前まで	300～500ml、100～150ㇿ	3回
	グロースガラス乳剤			ml/10a		播種後～発芽前	400～500ml、70～150ㇿ	1回
	パワーガイザー液剤			ml/10a		出芽直前～3葉期	200～300ml、100ㇿ	2回
	大豆バサグラン液剤	7月14日	100	ml/10a	100ㇿ	収穫45日前まで	100～150ml、100ㇿ	1回
	ボルトフロアブル	7月14日	200	ml/10a	100ㇿ	収穫30日前まで	200～300ml、100ㇿ	1回
	アタックショット乳剤			ml/10a		収穫45日前まで	35～50ml、100ㇿ	1回
	タッチダウンIQ			ml/10a		耕起又は播種7日以前	250～500ml、25～100ㇿ	2回
防除	クルーザーFS30	5月26日	8g/乾燥種子	1kg		播種前	0.6%種子粉衣	1回
	タントウ水液剤			ㇿ/10a		収穫前7日前まで	100～300ㇿ、2000～4000倍	3回
	アミスター20フロアブル			ㇿ/10a		収穫前7日前まで	100～400ㇿ、2000～3000倍	2回
	トレボン乳剤			ㇿ/10a		収穫前14日前まで	100～300ㇿ、1000倍	2回
	トレボン粉剤DL			4kg		収穫前14日前まで	4kg	2回
	トレバソフア775			ㇿ/10a		収穫前7日前まで	100～300ㇿ、4000倍	2回
	トレバソフア775			ㇿ/10a		収穫前7日前まで	100～300ㇿ、1000～2000倍	2回
	トレボン粉剤DL			3kg		収穫前14日前まで	3kg	2回
	無人ヘリ	8月24日	ベガスブランチ	1/10a	10ㇿ	ハダカスゴロアザミ(32倍)		
	無人ヘリ	9月6日	トレボントライ	1/10a	10ㇿ	トレボンスカイ(16倍)		

病虫害等	雑草の発生程度	なし (あり) (少) 中・多)
	虫害の発生程度	なし (あり) (少) 中・多)
	倒伏の程度	なし (あり) (少) 中・多)

記載のない資材は、空欄を利用して記載願います。

記載事項確認欄
JA加美よつば 米穀課