

JA新みやぎ みどりの地区

＜土作り日誌＞ 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。

＜防除日誌＞ 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区 分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入					
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	
土壌消毒	ガスタード微粒剤	20kg/10a	播種21日前迄	1	萎凋病・一年生雑草	/					
						/	/	/	/	/	
除草剤						/	/	/	/	/	
						/	/	/	/	/	
殺虫剤	ベストガード粒剤	9kg/10a	定植時・収穫3日前迄	1	アブラムシ・マメハモグリバエ	/	※(定植時の土壌混和は1回以内、株元処理は1回以内)				
	スタークル粒剤	9kg/10a	播種時・定植時	1	ハモグリバエ類	/					
	カルホス微粒剤F	6kg/10a	定植時	1	ネキリムシ類	/					
	アフーム乳剤	2000倍	収穫7日前迄	2	マメハモグリバエ・アザミウマ類	11/14	/				
	カスケード乳剤	2000～4000倍	収穫7日前迄	2	マメハモグリバエ・ヨトウムシ	/	/				
	スタークル顆粒水溶剤	3000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ類	/	/				
	アディオン乳剤	4000倍	収穫21日迄	2	アブラムシ類	/	/				
	エビセクト水和剤	2000倍	収穫14日迄	2	マメハモグリバエ	/	/				
	トリガード液剤	1000倍	収穫7日前迄	2	ハモグリバエ類	/	/				
	サブリナフロアブル	1000倍	発生初期収穫前日迄	—	コナガ・アオムシ・ヨトウムシ	/	/	/	/	/	
	オレート液剤	100倍	発生初期～収穫前日迄	—	アブラムシ類	/	/	/	/	/	
	粘着くん液剤	100倍	収穫前日迄	—	アブラムシ類・ハダニ類	/	/	/	/	/	
						/	/	/	/	/	
						/	/	/	/	/	
殺菌・種子粉衣						/	/	/	/	/	
						/	/	/	/	/	
殺菌剤	ストロビーフロアブル	3000倍	収穫14日前迄	3	炭疽病	/	/	/			
	アミスター20フロアブル	2000倍	収穫前日迄	2	炭疽病	/	/				
						/	/	/	/	/	
	※アミスター20フロアブルの使用は薬害に注意して下さい。					/	/	/	/	/	
						/	/	/	/	/	
確認印欄	栽培工程管理者					最終確認印欄					
	栽培工程管理責任者										