

JA新みやぎ

菊 截

地区名	宮城C		田尻		電話番号					
生産者名					生産者コード			前回作付品目	ホーレン草	
生産者住所					播種日	令和6年9月7日				
作付面積	60坪、a、m				定植日	令和6年10月1日				
登録圃場No.	ハウス・露地 No. 3				出荷予定期間	令和6年10月23日～3月10日				
<土作り日誌> 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。										
施肥月日	肥料資材名 《土壌分析に基づいた施肥設計》				保証成分 総窒素(有機)ーリン酸ー加里ー苦土ー石灰			肥料10a当り 施用量(kg)	坪数() 施用量(kg)	
9月26日	フルボール							15		
月 日	バイオフント							25		
月 日	X田カルシウム							6		
月 日										
月 日										
月 日										
月 日										
月 日										
<防除日誌> 使用した農薬をすべてお書き下さい。										
区分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入				
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
土壌消毒	ガスタード微粒剤	20kg/10a	播種21日前迄	1	萎凋病・一年生雑草	/				
						/	/	/	/	/
除草剤	アグロマックス水和剤	300g/10a 70リットル/10a	1 播種後発芽前雑草発生前	1	一年生雑草(タネ、カヤツリグサ科を除く)	/				
						/	/	/	/	/
殺虫剤	E4A ベストガード粒剤	9kg/10a	定植時	1	アブラムシ・マメハモグリバエ	/				
	E4A スタークル粒剤	9kg/10a	播種時	1	ハモグリバエ類	9/30				
	E1B カルホス微粒剤F	6kg/10a	定植時	1	ネキリムシ類	9/30				
	E3A アディオソ乳剤	4000倍	収穫21日前迄	2	アブラムシ類	/	/			
	E14 エピセクト水和剤	2000倍	収穫14日前迄	2	マメハモグリバエ	/	/			
	E6 アファーム乳剤	2000倍	収穫7日前迄	2	ハモグリバエ・アザミウマ類	/	/			
	E15 カスケード乳剤	2000～4000倍	収穫7日前迄	2	マメハモグリバエ・コウムシ・アザミウマ類	/	/			
	E17 トリガード液剤	1000倍	収穫7日前迄	2	ハモグリバエ類	/	/			
	E4A スタークル顆粒水溶剤	3000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ類	/	/	粒剤使用時は1回のみ		
	E11A サブリナフロアブル	1000倍	発生初期～収穫前日迄	-	コナガ・アオムシ・ヨトウムシ	10/28	/	/	/	/
	E29 ウララDF	4000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ類	/	/			
	E5 ディアナSC	2500～5000倍	収穫前日迄	2	ハモグリバエ類	/	/			
						/	/	/	/	/
殺菌・種子粉衣						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
殺菌剤	F:11 ストロビーフロアブル	3000倍	収穫14日前迄	3	炭疽病	/	/	/		
	F:11 アミスター20フロアブル	2000倍	収穫前日迄	2	炭疽病	/	/			
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
展着剤						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
確認月日	栽培工程管理者				栽培工程管理責任者					
	R 6 . 10 . 23	R . . .	R . . .	R . . .	R 6 . 10 . 23	R . . .	R . . .	R . . .	R . . .	R . . .