

栽培履歷簿

《 品名 ほうれん草 》

＜栽培内容＞

(品種名) ピントーン

JA新みやぎ みどりの地区

営農センター	小牛田	鹿島台	松山	涌谷	南郷	田尻	電話番号	45-5675	
生産者名	[Redacted]					生産者コード	09-5675-30	前回作付品目	小松菜
生産者住所	[Redacted]					播種日	令和 5年 10月 13日		
作付面積	75 坪					定植日	令和 年 月 日		
登録圃場No.	9					出荷予定期間	令和 5年 11月 24日 ~ 12月 15日		

＜土作り日誌＞ 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。

施肥月日	肥料資材名 《土壌分析に基づいた施肥設計》	保証成分 総窒素(有機)－リン酸－加里－苦土－石灰	肥料10a当り	坪数(75)
			施用量(kg)	施用量(kg)
10月7日	Z-P-MMB有機			23
月 日				
月 日				
月 日				
月 日				

＜防除日誌＞ 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区 分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入					
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	
土壌消毒	ガスタード微粒剤	20～30kg/10a	播種10日前迄	1	萎凋病・一年生雑草	/					
	クロールピクリン	2～3ミリ/穴	—	1	萎凋病・一年生雑草						
	ディトラベックス油剤	3～4ミリ/穴	収穫30日前迄	1	萎凋病・一年生雑草	/					
除草剤	アーザラン液剤	600～800ml/10a	播種後～子葉展開期	1	畑地一年生雑草	/					
	ラッソー乳剤	150ml/10a	播種直後	1	畑地一年生雑草	/					
						/	/	/	/	/	
殺虫剤	フォース粒剤	9kg/10a	播種時	1	ネキリムシ類	10/13					
	スタークル粒剤	6kg/10a	播種時	1	アブラムシ類	/					
	コテツフロアブル	4000～6000倍	2葉期まで (但し、収穫14日前	1	ホウレンソウケナガコナダニ	/	使用時は、薬害に注意する。				
	パダンSG水溶剤	1500倍	収穫7日前迄	2	ミナミキイロアザミウマ	/	/				
	アフーム乳剤	2000倍	収穫3日前迄	2	ハスモンヨトウ	/	/				
	カスケード乳剤	4000倍	収穫3日前迄	3	マメハモグリバエ・ケナガコナダニ	10/26	10/26	/			
	スタークル顆粒水溶剤	3000倍	収穫3日前まで	2	アブラムシ	/	/				
	アドマイヤーフロアブル	4000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ・アザミウマ類	/	/				
	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ	/	/				
	ダントツ水和剤	4000倍	収穫前日迄	3	アブラムシ類	/	/	/			
	ディアナSC	2500～5000倍	収穫前日迄	2	ハスモンヨトウ	10/26	11/1				
	アドマイヤー粒剤	4kg/10a	播種時	1	アブラムシ	10/13					
	コラリベイト	50kg 100g/5平米	播種時～2葉期	1	ホウレンソウ アザミウマ	10/19	/	/			
	ネオナカットフロアブル	1,000倍	収穫3日前迄	2	アブラムシ	10/26	11/1				
	ウララ DF	4,000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ	10/26	11/1				
モベントフロアブル	2,000倍	収穫14日前迄	3	ダニ・アブラムシ	10/27	/	/	/	/		
殺菌・種子粉衣						/	/	/	/	/	
						/	/	/	/	/	
殺菌剤	ユニホーム粒剤	9kg/10a	播種時	1	べと病	/					
	レーバスフロアブル	2000倍	収穫3日前迄	3	べと病	/	/	/			
	ランマンフロアブル	2000倍	収穫3日前迄	2	べと病	/	/	/			
	フェスティバル水和剤	2000倍	収穫前日迄	3	べと病	/	/	/	/	/	
確認印欄	栽培工程管理者 11/22						最終確認印欄				
	栽培工程管理責任者 12/11										