

120380

JA新みやぎ みどりの地区

＜土作り目録＞ 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。

＜防除日誌＞ 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入				
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
土壌消毒	ガスタード微粒剤	20～30kg/10a	播種10日前迄	1	萎凋病・一年生雑草	/				
	クロールピクリン	2～3ミリ/穴	—	1	萎凋病・一年生雑草	/				
	ディ・トラベックス油剤	3～4ミリ/穴	収穫30日前迄	1	萎凋病・一年生雑草	/				
除草剤	アージラン液剤	600～800ml/10a	播種前～播種後	1	畑地一年生雑草	/				
	ラッソー乳剤	150ml/10a	播種直後	1	畑地一年生雑草	/				
殺虫剤	フォース粒剤	9kg/10a	播種時	1	ネキリムシ類	4/27				
	スタークル粒剤	6kg/10a	播種時	1	アブラムシ類	/				
	コテツフロアブル	4000～6000倍	2020.10.10～2020.12.10(2)	1	ホウレンソウケナガコナダニ	/	使用時は、葉害に注意する。			
	バデンSG水溶剤	1500倍	収穫7日前迄	2	ミナミキイロアザミウマ	/	/			
	アフーム乳剤	2000倍	収穫3日前迄	2	ハスモンヨトウ	/	/			
	カスケード乳剤	4000倍	収穫3日前迄	3	マメハモグリバエ・ケナガコナダニ	5/31	/	/		
	スタークル顆粒水溶剤	3000倍	収穫3日前迄	2	アブラムシ	/	/	粒剤使用時は1回のみ		
	アドマイヤーフロアブル	4000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ・アザミウマ類	/	/			
	スビノエース顆粒水和剤	5000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ	5/9	5/16			
	ダントツ水和剤	4000倍	収穫前日迄	3	アブラムシ類	/	/	/		
	ディアナSC	2500～5000倍	収穫前日迄	2	ハスモンヨトウ	5/16	/			
	アドマイヤー粒剤	4kg/10a	播種時	1	アブラムシ	4/27				
	コテツバイト	1.5kg			ダニ	5/5	/	/	/	/
殺菌・種子粉衣						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
殺菌剤	ユニホーム粒剤	9kg/10a	播種時	1	べと病	/				
	レーバスフロアブル	2000倍	収穫3日前迄	3	べと病	/	/	/		
	ランマンフロアブル	2000倍	収穫3日前迄	2	べと病	5/9	5/31			
	フェスティバル水和剤	2000倍	収穫前日迄	3	べと病	/	/	/		
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
確認印欄	栽培工程管理者 6/9 [印]						最終確認印欄			
	栽培工程管理責任者 6/10 [印]									