

栽培履歴簿

《 品名 ほうれん草 》

＜栽培内容＞

(品種名) ジャスティアス

JA新みやぎ みどりの地区

宮農センター	小牛田	鹿島台	松山	浦谷	南郷	田尻	電話番号		
生産者名						生産者コード		前回作付品目	ほうれん草
生産者住所						播種日	令和 5 年 5 月 3 日		
作付面積	75 坪					定植日	令和 年 月 日		
登録圃場No.	9					出荷予定期間	令和 5 年 6 月 1 日 ~ 6 月 8 日		

＜土作り日誌＞ 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。

施肥月日	肥料資材名 《土壌分析に基づいた施肥設計》	保証成分 総窒素(有機)ーリン酸ー加里ー苦土ー石灰	肥料10a当り	坪数(75)
			施用量(kg)	施用量(kg)
4月25日	R-10-MMB有機			22
月 日				
月 日				
月 日				
月 日				

＜防除日誌＞ 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区 分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入				
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
土壌消毒	ガスタード微粒剤	20～30kg/10a	播種10日前迄	1	萎凋病・一年生雑草	/				
	クロールピクリン	2～3ミリ/穴	—	1	萎凋病・一年生雑草					
	ディ・トラベックス油剤	3～4ミリ/穴	収穫30日前迄	1	萎凋病・一年生雑草	/				
除草剤	アーザラン液剤	600～800ml/10a	播種後～子葉展開期	1	畑地一年生雑草	/				
	ラッソー乳剤	150ml/10a	播種直後	1	畑地一年生雑草	/				
						/	/	/	/	/
殺虫剤	フォース粒剤	9kg/10a	播種時	1	ネキリムシ類	5/3				
	スタークル粒剤	6kg/10a	播種時	1	アブラムシ類	/				
	コテツフロアブル	4000～6000倍	2葉期まで (但し、収穫14日前)	1	ホウレンソウケナガコナダニ	/	使用時は、薬害に注意する。			
	パダンSG水溶剤	1500倍	収穫7日前迄	2	ミナミキイロアザミウマ	/	/			
	アフーム乳剤	2000倍	収穫3日前迄	2	ハスモンヨトウ	/	/			
	カスケード乳剤	4000倍	収穫3日前迄	3	マメハモグリバエ・ケナガコナダニ	5/23	/	/		
	スタークル顆粒水溶剤	3000倍	収穫3日前まで	2	アブラムシ	/	/			
	アドマイヤーフロアブル	4000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ・アザミウマ類	/	/			
	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ	/	/			
	ダントツ水和剤	4000倍	収穫前日迄	3	アブラムシ類	/	/	/		
	ディアナSC	2500～5000倍	収穫前日迄	2	ハスモンヨトウ	/	/			
	アドマイヤー粒剤	4kg/10a	播種時	1	アブラムシ	5/3				
	コテツ バイト	6kg/10a	播種後2葉期迄	1	アブラムシ・アザミウマ類	5/19	/	/		
	モベントフロアブル	2,000倍	4日前迄	3	アブラムシ	5/15	/			
	ネオナカットフロアブル	1,000倍	3日前迄	2	アブラムシ	5/20	/	/	/	/
ウララ DF	4,000倍	収穫前日	2	アブラムシ	5/20	/	/	/	/	
殺菌・種子粉衣						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
殺菌剤	ユニホーム粒剤	9kg/10a	播種時	1	べと病	/				
	レーバスフロアブル	2000倍	収穫3日前迄	3	べと病	/	/	/		
	ランマンフロアブル	2000倍	収穫3日前迄	2	べと病	/	/	/		
	フェスティバル水和剤	2000倍	収穫前日迄	3	べと病	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
確認印欄	栽培工程管理者 6/2									最終確認印欄
	栽培工程管理責任者 6/6									