栽培履歴簿 ≪ 品名 ねぎ ≫ 311900

1004共版
JAみどりの

<栽培内容> (品種名) 竜みのり

営農センター	小牛田	鹿島台	松山	涌谷	南郷	田尻	電話番号	[redacted]	
生産者名	[redacted]						生産者コード	[redacted]	前回作付品目 葱、
生産者住所	[redacted]						播種日	平成/令6年 2月 8日	
作付面積	10 アール					坪	定植日	平成/令6年 4月 15日	
登録圃場No.	[redacted]						出荷予定期間	平成/令6年 10月25日～ 月 日	

<土作り日誌> 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。

施肥月日	肥料資材名 《土壌分析に基づいた施肥設計》	保証成分 総窒素(有機)－リン酸－加里－苦土－石灰				肥料10a当り 施用量(kg)	坪数( ) 施用量(kg)
6年 3月25日	ケイフン(化グリーン)	21	42	34	16	120	
3月25日	刈割大麦(80Kトンクレーン)	0.2	0.8	0.4	45	100 ~~80~~	
4月28日	ケイ酸用化成	15	15	10		15	
5月17日	ネギ専用108号	16	10	8		50	
6月11日	〃	16	10	8		140	
7月15日	尿素	46				20	

<防除日誌> 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区分	使用資材 薬剤名	使用基準 希釈倍率または使用量	使用時期	回数	病害虫草	使用月日を下記に記入 1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
土壌消毒(殺虫・殺菌)	ガスタード微粒剤	20～30kg	播種又は定植21日前迄	1	ネコブセンチュウ・一年生雑草	/	[redacted]			
除草剤	ゴーゴーサン乳剤	200～300ml／10a	定植後10日迄	1	一年生雑草	4/19	[redacted]			
	ナブ乳剤	150～200ml／10a	収穫30日前迄	1	一年生イネ科雑草	/	[redacted]			
						/	/	/	/	/
殺菌剤	ダコニール1000	1000倍 ※灌注は、500倍	収穫14日前迄	2	黒斑病・べと病・葉枯病	/	/	土壌灌注は1回		
	オリゼメート粒剤	6kg／10a	収穫30日前迄	2	軟腐病	/	/	(土寄せ時に株元散布)		
	ポリオキシンAL水和剤	1000倍	収穫14日前迄	3	黒斑病	/	/	/	[redacted]	
	リドミルMZ水和剤 ※	1000倍	収穫30日前迄	3 ※	ベト病	/	/	/	成分総使用回数計3回迄	
	テーク水和剤 ※	600倍	収穫30日前迄	3 ※	べと病・葉枯病・さび病	7/14	/	/		
	バイレトン水和剤5	400～600倍	収穫14日前迄	3	さび病	/	/	/	[redacted]	
	オンリーワンフロアブル	1000倍	収穫14日前迄	3	さび病・黒斑病	/	/	/		
	ラリー水和剤	2000倍	収穫7日前迄	3	さび病	/	/	/		
	ストロビーフロアブル	2000倍	収穫7日前迄	3	黒斑病・さび病	/	/	/		
	アミスター20フロアブル	2000倍	収穫3日前迄	4	べと病・さび病・葉枯病	6/19	10/21	/	/	
	アリエッティ水和剤	800倍	収穫3日前迄	3	べと病・疫病	/	/	/	[redacted]	
	スターナ水和剤	2000倍	収穫21日前迄	3	軟腐病	/	/	/		
	アフェット フロアブル	2000	当日	2	サビ、黒斑	7/14	/	/	/	/
	クプロシールドフロアブル	1000	—	—	ベト病	7/31	/	/	/	/
	メジャーフロアブル	2000	前日	3	さび、ベト	9/17	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/

確認印欄

栽培工程管理者 11/19 [redacted]

栽培工程管理責任者 11/20 [redacted]

最終確認印欄

1004共販

<防除日誌> 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入				
	薬剤名	希釈倍率または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
殺虫剤	スタークル粒剤	6kg／10a	定植時	1	ﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ・ｱｻﾞﾐｳﾏ類	／				
	ダイアジノン粒剤5	4～6kg／10a	播種又は定植時	2	ｺｶﾞﾈﾑｼ類幼虫	4/28	／			
	カルホス微粒剤F	6kg／10a	播種時・植付時	1	ﾈｷﾘﾑｼ類	／				
	アドマイヤーフロアブル	2000～4000倍	収穫14日前迄	2	ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ	／	／			
	モスピラン水溶剤	2000倍	収穫7日前迄	3	ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ類	／	／	／		
	アグロスリン乳剤	1000～2000倍	収穫7日前迄	5	ｱﾌﾞﾗﾑｼ類・ﾈｷﾞｺｶﾞ・ﾈｷﾞﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ	／	／	／	／	／
	アディオン乳剤	2000～3000倍	収穫7日前迄	3	ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ	／	／	／		
	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	収穫3日前迄	3	ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ	／	／	／		
	コテツフロアブル	2000倍	収穫7日前迄	2	ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ	／	／			
	アファーム乳剤	1000～2000倍	収穫7日前迄	3	ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ	／	／	／		
	ダントツ粒剤(露地栽培) ※	3～6kg／10a	収穫21日前迄	2 ※	ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ・ﾈｷﾞﾊﾓｸﾞﾘﾊﾞｴ	8/25	／			※計4回迄
	ダントツ水溶剤 ※	2000～4000倍	収穫3日前迄	4 ※		／	／	／	／	
	ハチハチ乳剤	1000倍	収穫3日前迄	2	ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ・さび病	／	／			
	プレオフロアブル	1000倍	収穫3日前迄	4	ﾈｷﾞｱｻﾞﾐｳﾏ・ｼﾛｲﾁﾓｼﾞﾖﾄｳ	／	／	／	／	
	プレバソンフロアブル	2000	〃	3	ネギハモグリバエ	7/4	／	／	／	／
	ベリマーク水和剤	6kg/10a	前日	3	アザミウマ、ハモグリバエ	7/13	／	／	／	／
	ベストガード水	1000	〃	3	〃 〃	7/31	／	／	／	／
	ベネビア OD	2000	〃	3	〃 〃	8/15	／	／	／	／
	グレーシア乳剤	2000～3000	7日前	2	〃 〃	9/17	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／
						／	／	／	／	／

確認印欄		最終確認印欄
栽培工程管理者	11/19 [redacted]	
栽培工程管理責任者	11/20 [redacted]	