

栽培履歴簿

《品名

ねぎ

》

311900

1004共販

JAみどりの

<栽培内容>

(品種名)

夏扇パー

営農センター	小牛田	鹿島台	松山	涌谷	南郷	田尻	電話番号	3229-55-1832
生産者名	[redacted]					生産者コード	[redacted]	
生産者住所	[redacted]					播種日	平成5年3月12日	
作付面積	10a 坪 3					定植日	平成5年4月18日	
登録圃場No.	[redacted]					出荷予定期間	平成5年9月1日～9月30日	

<土作り日誌> 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。

施肥月日	肥料資材名 《土壌分析に基づいた施肥設計》	保証成分 総窒素(有機)ーリン酸ー加里ー苦土ー石灰	肥料10a当り	坪数()
			施用量(kg)	施用量(kg)
3月12日	専用培土			
4月18日	608	16-10-8	50kg	
5月26日	604	16-10-18	50kg	
月 日				
月 日				

<防除日誌> 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入				
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
土壌消毒 (殺虫・殺菌)	ガスタード微粒剤	20～30kg	播種又は定植21日前迄	1	ネコブセンチュウ・一年生雑草	/	/	/	/	/
除草剤	ゴーゴーサン乳剤	200～300ml/10a	定植後10日迄	122	一年生雑草	/	/	/	/	/
	ナブ乳剤	150～200ml/10a	収穫30日前迄	5.130	一年生イネ科雑草	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
殺菌剤	ダコニール1000	1000倍 ※灌注は、500倍	収穫14日前迄	2	黒斑病・べと病・葉枯病	3/28	/	土壌灌注は1回		
	オリゼート粒剤	6kg/10a	収穫30日前迄	2	軟腐病	5/26	/	(土寄せ時に株元散布)		
	ポリオキシシンAL水和剤	1000倍	収穫14日前迄	3	黒斑病	/	/	/	/	/
	リドミルMZ水和剤 ※	1000倍	収穫30日前迄	3 ※	べと病	/	/	/	成分総使用 回数計3回迄	
	テーク水和剤 ※	600倍	収穫30日前迄	3 ※	べと病・葉枯病・さび病	/	/	/		
	バイレトン水和剤5	400～600倍	収穫14日前迄	3	さび病	/	/	/	/	/
	オンリーワンフロアブル	1000倍	収穫14日前迄	3	さび病・黒斑病	/	/	/	/	/
	ラリー水和剤	2000倍	収穫7日前迄	3	さび病	/	/	/	/	/
	ストロビーフロアブル	2000倍	収穫7日前迄	3	黒斑病・さび病	/	/	/	/	/
	アミスター20フロアブル	2000倍	収穫3日前迄	4	べと病・さび病・葉枯病	/	/	/	/	/
	アリエッティ水和剤	800倍	収穫3日前迄	3	べと病・疫病	/	/	/	/	/
	スターナ水和剤	2000倍	収穫21日前迄	3	軟腐病	/	/	/	/	/
	アズート	2000	収穫前日まで	2	軟腐病	7/38	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/

栽培工程管理者



栽培工程管理者印欄



最終確認印欄

区 分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入				
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
殺虫剤	スタークル粒剤	6kg/10a	定植時	1	ハモグリハエ・アサミウマ類	5/26	/	/	/	/
	ダイアジノン粒剤5	4~6kg/10a	播種又は定植時	2	コガネムシ類幼虫	/	/	/	/	/
	カルホス微粒剤F	6kg/10a	播種時・植付時	1	ネキリムシ類	/	/	/	/	/
	アドマイヤーフロアブル	2000~4000倍	収穫14日前迄	2	ネギ'アサ'ミウマ	/	/	/	/	/
	モスピラン水溶剤	2000倍	収穫7日前迄	3	ネギ'アサ'ミウマ類	/	/	/	/	/
	アグロスリン乳剤	1000~2000倍	収穫7日前迄	5	アブラムシ類・ネギ'コガ'ネギ'ハモグリハエ	/	/	/	/	/
	アディオン乳剤	2000~3000倍	収穫7日前迄	3	シロイチモジ'ヨトウ	/	/	/	/	/
	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	収穫3日前迄	3	シロイチモジ'ヨトウ	/	/	/	/	/
	コテツフロアブル	2000倍	収穫7日前迄	2	シロイチモジ'ヨトウ	/	/	/	/	/
	アフーム乳剤	1000~2000倍	収穫7日前迄	3	シロイチモジ'ヨトウ	/	/	/	/	/
	ダントツ粒剤(露地栽培) ※	3~6kg/10a	収穫21日前迄	2 ※	ネギ'アサ'ミウマ・ネギ'ハモグリハエ	/	/	/	/	※ 計4回迄
	ダントツ水溶剤 ※	2000~4000倍	収穫3日前迄	4 ※		/	/	/	/	
	ハチハチ乳剤	1000倍	収穫3日前迄	2	ネギ'アサ'ミウマ・さび病	/	/	/	/	/
	プレオフロアブル	1000倍	収穫3日前迄	4	ネギ'アサ'ミウマ・シロイチモジ'ヨトウ	/	/	/	/	/
	グレーシア	2000倍	収穫7日前迄	2	アサミウマ類	/	/	/	/	/
						7/30	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/

確認 印欄	栽培工程管理者 	最終確認 印欄	
	栽培工程管理責任者の 署名  5年 9-7		