

栽培履歷簿

《品名

夏秋きゅうり

»

110070

＜栽培内容＞

(品種名)

JA新みやぎ みどりの地区

営農センター	小牛田	鹿島台	松山	涌谷	南郷	田尻	電話番号			
生産者名						印	生産者コード			前回作付品目
生産者住所							播種日	令和 6 年 5 月 20 日		
作付面積	300 坪						定植日	令和 年 6 月 10 日		
登録圃場No.							出荷予定期間	令和 年 6 月 22 日 ~ 9 月 10 日		

<土作り日誌> 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。

[illegible]

＜防除日誌＞ 使用した農薬をすべてお書き下さい。

＜防除日誌＞ 使用した農薬をすべてお書き下さい。										
区 分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入				
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
土壌消毒	バスアミド微粒剤	20～30kg/10a	は種又は定植21日前迄	1	苗立枯病・半身萎凋病・一年生雑草	/				
	ガスタード微粒剤	20～30kg/10a	は種又は定植21日前迄	1	苗立枯病・半身萎凋病・一年生雑草	/				
	クロールピクリン	1穴当り2～3ml	-	1	つる割病・疫病・センチュウ類	/				
除草剤	トレファノサイド粒剤2.5	3～4kg/10a	定植前(植穴掘前)	1	一年生雑草	/				
	トレファノサイド乳剤	100L/10a	定植前(植穴掘前)	1	一年生雑草	/				
						/	/	/	/	/
殺菌・種子粉衣						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/

確認印欄	栽培工程管理書 7/10 	最終確認印欄	
	栽培工程管理責任者 7/11 		

<防除日誌> 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区 分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入				
		希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
殺虫剤	ネマキック粒剤	15~20kg/10a	定植前	1	ネコブセンチュウ	/				
	ダイアジノン粒剤5	4~6kg/10a	は種時又は定植時	1	ネキリムシ類・タネバエ・ケラ	/				
	バイデートL粒剤	25~50kg/10a	は種時又は定植時	1	ネグサレセンチュウ・ネコブセンチュウ	/				
	スタークル粒剤	1~2g/株	定植時	1	アザミウマ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類	/				
	ベストガード粒剤	1~2g/株	定植時	1	アブラムシ類・アザミウマ類・コナジラミ類	/				
	アドマイヤー水和剤	2000倍	収穫前日迄	3	アザミウマ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類	/	/	/		
	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日迄	2	アザミウマ類・コナジラミ類・ウリハムシ	/	/			
	ベストガード水溶剤	1000~2000倍	収穫前日迄	3	コナジラミ類・ミナミキロアザミウマ	/	/	/		
	トランスフォームフロアブル	1000~2000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ類・コナジラミ類	/	/			
	モベントフロアブル	2000倍	収穫前日迄	3	アザミウマ類・コナジラミ類	7/9	/	/		
	コテツフロアブル	2000倍	収穫前日迄	3	ウリノメイガ・ウリハムシ・ハダニ類	/	/	/		
	コルト顆粒水溶剤	4000倍	収穫前日迄	3	アブラムシ類・コナジラミ類	/	/	/		
	アファーム乳剤	2000倍	収穫前日迄	2	アザミウマ類・ウリノメイガ・コナジラミ類	6/27	/			
	コロマイト乳剤	1000~1500倍	収穫前日迄	2	コナジラミ類・ハダニ類・ハモグリバエ類	/	/			
	スピノエース顆粒水溶剤	5000倍	収穫前日迄	2	アザミウマ類・ウリノメイガ・ハモグリバエ類	/	/			
	ディアナSC	2500~5000倍	収穫前日迄	2	アザミウマ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類	/	/			
	プレバゾンフロアブル5	1000~2000倍	収穫前日迄	3	ウリノメイガ・ハモグリバエ類	/	/	/		
	グレーシア乳剤	2000倍	収穫前日迄	2	アザミウマ類・ウリノメイガ・ハダニ類	7/9	7/14			
	アグリメック	500~1000倍	収穫前日迄	2	アザミウマ類・コナジラミ類・ハダニ類	/	/			
						/	/	/	/	/
					/	/	/	/	/	
					/	/	/	/	/	
殺菌剤	オリゼメート粒剤	6~7.5kg/10a	定植時	1	斑点細菌病	6/10				
	ダコニール1000	1000倍	収穫前日まで	8	うどんこ病・灰色かび病・べと病	6/20	6/27	/		
	アミスター20フロアブル	1500~2000倍	収穫前日まで	4	褐斑病・うどんこ病・べと病	/	/	/	/	
	バレード20フロアブル	2000~4000倍	収穫前日まで	3	褐斑病・菌核病・うどんこ病	/	/	/		
	プロボーズ顆粒水和剤	1000~1500倍	収穫前日まで	3	褐斑病・黒星病・べと病	/	/	/		
	ストロビーフロアブル	3000倍	収穫前日まで	3	褐斑病・炭そ病・べと病	/	/	/		
	ファンベル顆粒水和剤	1000倍	収穫前日まで	3	うどんこ病・褐斑病・菌核病	/	/	/		
	セイビアーフロアブル	1000~1500倍	収穫前日まで	3	褐斑病・菌核病・灰色かび病	/	/	/		
	ベルコート水和剤	2000~4000倍	収穫前日まで	7	褐斑病・炭そ病・灰色かび病	/	/	/	/	/
	ジマンダイセン水和剤	600倍	収穫前日まで	3	炭そ病・疫病・斑点細菌病	7/9	/	/		
	テーク水和剤	600~800倍	収穫前日まで	3	うどんこ病・炭そ病・べと病	/	/			
	ベフドー水和剤	500~1000倍	収穫前日まで	7	褐斑病・炭そ病・斑点細菌病	/	/	/	/	/
	トップジンM水和剤	1500~2000倍	収穫前日まで	5	炭そ病・つる枯病・灰色かび病	/	/	/	/	/
	ゲッター水和剤	1500倍	収穫前日まで	5	褐斑病・菌核病・炭そ病	/	/	/	/	/
	スミブレンド水和剤	1500~2000倍	収穫前日まで	5	褐斑病・菌核病・灰色かび病	/	/	/	/	/
	ハチハチ乳剤	1000倍	収穫前日まで	2	褐斑病・べと病・アザミウマ類	/	/			
	Zボルドー	500倍		-	褐斑細菌病・斑点細菌病・べと病	/	/	/	/	/
	フェステイブル水和剤	600倍	収穫前日まで		べと病	7/8	/	/	/	/
					/	/	/	/	/	
展着剤						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
確認印欄	栽培工程管理者 [印]					最終確認印欄				
	栽培工程管理責任者 [印]									