

<防除日誌> 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区 分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入				
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
殺虫剤	ネマキック粒剤	15~20kg/10a	定植前	1	ネコブセンチュウ	/				
	ダイアジノン粒剤5	4~6kg/10a	は種時又は定植時	1	ネキリムシ類・タネバエ・ケラ	/				
	バイデートL粒剤	25~50kg/10a	は種時又は定植時	1	ネグサレセンチュウ・ネコブセンチュウ	/				
	スタークル粒剤	1~2g/株	定植時	1	アザミウマ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類	/				
	ベストガード粒剤	1~2g/株	定植時	1	アブラムシ類・アザミウマ類・コナジラミ類	/				
	アドマイヤー水和剤	2000倍	収穫前日迄	3	アザミウマ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類	9/9	/	/		
	スタークル顆粒水溶剤	2000倍	収穫前日迄	2	アザミウマ類・コナジラミ類・ウリハムシ	/	/			
	ベストガード水溶剤	1000~2000倍	収穫前日迄	3	コナジラミ類・ミナミキロアザミウマ	/	/	/		
	トランスフォームフロアブル	1000~2000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ類・コナジラミ類	10/10	/			
	モベントフロアブル	2000倍	収穫前日迄	3	アザミウマ類・コナジラミ類	8/19	/	/		
	コテツフロアブル	2000倍	収穫前日迄	3	ウリノメイガ・ウリハムシ・ハダニ類	/	/	/		
	コルト顆粒水溶剤	4000倍	収穫前日迄	3	アブラムシ類・コナジラミ類	/	/	/		
	アファーム乳剤	2000倍	収穫前日迄	2	アザミウマ類・ウリノメイガ・コナジラミ類	7/31	8/4			
	コロマイト乳剤	1000~1500倍	収穫前日迄	2	コナジラミ類・ハダニ類・ハモグリバエ類	/	/			
	スピノエース顆粒水溶剤	5000倍	収穫前日迄	2	アザミウマ類・ウリノメイガ・ハモグリバエ類	/	/			
	アザミウマ グレーシア	2500 5000倍	収穫前日迄	2	アザミウマ類・コナジラミ類・ハモグリバエ類	10/1	/			
	プレバゾンフロアブル5	1000~2000倍	収穫前日迄	3	ウリノメイガ・ハモグリバエ類	/	/	/		
	アザミウマ 乳剤 アグタラ	2000倍	収穫前日迄	2	アザミウマ類・ウリノメイガ・ハモグリバエ類	9/25	/			
	アザミウマ フルピカ	500 1000倍	収穫前日迄	2	アザミウマ類・コナジラミ類・ハダニ類	9/18	/			
	ベネヒア	2000倍	収穫前日迄	3	アブラムシ類・コナジラミ類	7/24	/	/	/	/
ウララ	2000倍	収穫前日迄	3	アブラムシ類・コナジラミ類	8/11	/	/	/	/	
ディナ	2500倍	収穫前日迄	2	アブラムシ類	9/1	/	/	/	/	
殺菌剤	オリゼメート粒剤	6~7.5kg/10a	定植時	1	斑点細菌病	/				
	ダコニール1000	1000倍	収穫前日迄	8	うどんこ病・灰色かび病・べと病	/	/	/		
	アミスター20フロアブル	1500~2000倍	収穫前日迄	4	褐斑病・うどんこ病・べと病	/	/	/	/	
	パレード20フロアブル	2000~4000倍	収穫前日迄	3	褐斑病・菌核病・うどんこ病	10/10	/	/		
	プロボース顆粒水和剤	1000~1500倍	収穫前日迄	3	褐斑病・黒星病・べと病	9/1	9/9	/		
	ストロビーフロアブル	3000倍	収穫前日迄	3	褐斑病・炭そ病・べと病	8/11	/	/		
	ファンベル顆粒水和剤	1000倍	収穫前日迄	3	うどんこ病・褐斑病・菌核病	/	/	/		
	セイビアーフロアブル	1000~1500倍	収穫前日迄	3	褐斑病・菌核病・灰色かび病	9/25	/	/		
	ベルクート水和剤	2000~4000倍	収穫前日迄	7	褐斑病・炭そ病・灰色かび病	7/24	/	/	/	/
	ジマンダイセン水和剤	600倍	収穫前日迄	3	炭そ病・疫病・斑点細菌病	7/31	10/1	/		
	テーク水和剤	800~800倍	収穫前日迄	3	うどんこ病・炭そ病・べと病	/	/	/		
	ベフドー水和剤	500~1000倍	収穫前日迄	7	褐斑病・炭そ病・斑点細菌病	/	/	/	/	/
	トップジンM水和剤	1500~2000倍	収穫前日迄	5	炭そ病・つる枯病・灰色かび病	/	/	/	/	/
	ゲッター水和剤	1500倍	収穫前日迄	5	褐斑病・菌核病・炭そ病	/	/	/	/	/
	スミブレンド水和剤	1500~2000倍	収穫前日迄	5	褐斑病・菌核病・灰色かび病	/	/	/	/	/
	ハチハチ乳剤	1000倍	収穫前日迄	2	褐斑病・べと病・アザミウマ類	/	/			
	アミスター スターマイト	2000 5000倍	-	-	褐斑病・炭そ病・斑点細菌病・べと病	9/18	/	/	/	/
	バリマー7SC	800倍	収穫前日迄	4	5000/1株	7/19	/	/	/	/
	ドーシス	1000倍	収穫前日迄	4	炭そ病	8/19	/	/	/	/
	展着剤						/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
確認印欄	栽培工程管理者 10/15 藤本					最終確認印欄				
	栽培工程管理責任者 10/16 木村									