

JAみどりの

区 分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入				
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
土壌消毒	ガスタード微粒剤	20～30kg 10a	播種又は定植2日前まで	1	半身茎腐病・へる割病・地下部根腐	/	/	/	/	/
	クローールヒクリン	＜圃場＞1穴100ml	—	1	ホモシシ根腐病	/	/	/	/	/
	70ピクテ-7°		6/30～7/16	1		/		/	/	/
除草剤						/			/	/
						/			/	/
						/			/	/
殺菌・種子粉衣						/		/	/	/
						/		/	/	/
確認 印欄	栽培工程管理者  10/2						最終 確認 印欄			
	栽培工程管理責任者  10/4									

<防除日誌> 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区 分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入					
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	
殺虫剤	ネマトリン粒剤	20～30kg/10a	播種前又は定植前	1	ネコブセンチュウ・ハダニ類	/	/	/	/	/	
	ハイドレート粒剤	25～50kg/10a	播種前又は定植前	1	ネコブセンチュウ・ネグサレセンチュウ	/	/	/	/	/	
	アドマイヤー1粒剤	1～2g/株	育苗期後半・定植時	1	アブラムシ類・コナジラミ類	/	/	/	/	/	
	オンコル粒剤5	0.5g～1g/株	育苗期後半・定植時	1	アブラムシ類・ミカンキイロアザミウマ	/	/	/	/	/	
	スタークル粒剤	1～2g/株	定植時	1	アブラムシ類・コナジラミ類	/	/	/	/	/	
	モスピラン粒剤	0.5～1g/株	定植時	1	アブラムシ類	/	/	/	/	/	
	アクタラ粒剤5	1g/株	定植時	1	アブラムシ類・コナジラミ類	/	/	/	/	/	
	アドマイヤー水和剤	2000倍	収穫前日迄	3	アブラムシ類・コナジラミ類	/	/	/	/	/	
	アグロスリン乳剤	2000倍	収穫前日迄	5	アブラムシ類・オンシツコナジラミ	/	/	/	/	/	
	アファーム乳剤	2000倍	収穫前日迄	2	ハスモンヨトウ・ウリノメイガ	9/7	9/22	/	/	/	
	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	収穫前日迄	2	アザミウマ類・トマトハモグリハエ	/	/	/	/	/	
	ベストガード水溶剤	1000～2000倍	収穫前日迄	3	アブラムシ類・コナジラミ類	/	/	/	/	/	
	モスピラン水溶剤	2000～4000倍	収穫前日迄	3	アブラムシ類・コナジラミ類	9/17	/	/	/	/	
	コデツプロアブル	2000倍	収穫前日迄	2	ハダニ類・ミナミキイロアザミウマ	/	/	/	/	/	
	コロマイト乳剤	1000～1500倍	収穫前日迄	2	ハダニ類	/	/	/	/	/	
	ピラニアBW	2000～3000倍	収穫前日迄	1	ハダニ類	/	/	/	/	/	
	アーデント水和剤	1000倍	収穫前日迄	4	アブラムシ類・オンシツコナジラミ・ハダニ類	/	/	/	/	/	
	オサダン水和剤25	1000～1500倍	収穫前日迄	2	ハダニ類	/	/	/	/	/	
	ニッソラン水和剤	2000～3000倍	収穫前日迄	2	ハダニ類	/	/	/	/	/	
	ハチハチ乳剤	1000～2000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ類・コナジラミ類・ウリノメイガ	/	/	/	/	/	
うううDF	2000倍	収穫前日迄	3	アブラムシ類・コナジラミ類	8/30	9/19	/	/	/		
殺菌剤	オリゼート粒剤	6～7.5kg/10a(5g/株)	定植時	1	斑点細菌病	/	/	/	/	/	
	アミスター20フロアブル	1500～2000倍	収穫前日迄	4	うどんこ病・べと病・褐斑病	8/13	/	/	/	/	
	カンタスドライフロアブル	1000～1500倍	収穫前日迄	3	褐斑病・菌核病・灰色カビ病	/	/	/	/	/	
	ゲッター水和剤	1500倍	収穫前日迄	5	褐斑病・菌核病	/	/	/	/	/	
	ダコニール1000	1000倍	収穫前日迄	8	うどんこ病・べと病・褐斑病	9/28	/	/	/	/	
	テーク水和剤	600～800倍	収穫前日迄	3	べと病・うどんこ病・褐斑病	/	/	/	/	/	
	トップジンM水和剤	1500～2000倍	収穫前日迄	5	うどんこ病・菌核病・炭そ病	8/6	/	/	/	/	
	トリフミン水和剤	3000～5000倍	収穫前日迄	5	うどんこ病	/	/	/	/	/	
	ハンソイル乳剤	3000倍	収穫開始11日前日迄	2	立枯性疫病	/	/	/	/	/	
	ベルコート水和剤	2000～4000倍	収穫前日迄	5	灰色かび病・うどんこ病・炭そ病	/	/	/	/	/	
	ホライズンドライフロアブル	2500倍	収穫前日迄	3	べと病	/	/	/	/	/	
	モレスタン水和剤	2000～4000倍	収穫前日迄	3	うどんこ病	/	/	/	/	/	
	ランマンフロアブル	1000～2000倍	収穫前日迄	4	べと病	9/7	/	/	/	/	
	リドミルM2水和剤	1000倍	収穫前日迄	3	べと病	/	/	/	/	/	
	パンチョTP顆粒水和剤	2000倍	収穫前日迄	2	うどんこ病	/	/	/	/	/	
	フルピカフロアブル	2000～3000倍	収穫前日迄	4	灰色かび病・うどんこ病・褐斑病	/	/	/	/	/	
	ダイセド水和剤	500倍	収穫前日迄	4	べと病・斑点細菌病・うどんこ病	/	/	/	/	/	
	ポリオキシンAL水和剤	1000倍	収穫前日迄	3	うどんこ病	/	/	/	/	/	
	フロボーズ顆粒水和剤	1000～1500倍	収穫前日迄	3	べと病・褐斑病	/	/	/	/	/	
	ベルコートフロアブル	2000倍	収穫前日迄	5	灰色かび病・うどんこ病・炭そ病	9/17	/	/	/	/	
	ストロビーフロアブル	3000倍	収穫前日迄	3	灰色かび病・うどんこ病・炭そ病	8/30	9/19	/	/	/	
	ビスダイセン水和剤	600～800倍	収穫前日迄	2	べと病・炭そ病・黒星病	/	/	/	/	/	
	バイレトン水和剤5	2000～3000倍	収穫前日迄	4	うどんこ病	/	/	/	/	/	
	シトラノフロアブル	1000～1200倍	収穫前日迄	5	べと病・褐斑病	/	/	/	/	/	
	セイビアーフロアブル20	1000～1500倍	収穫前日迄	3	灰色かび病・菌核病	/	/	/	/	/	
	バイコラル水和剤	2500～5000倍	収穫前日迄	4	うどんこ病	/	/	/	/	/	
	ベアード水和剤	500倍	収穫前日迄	3	べと病・うどんこ病・炭そ病	/	/	/	/	/	
	ドーシヤスフロアブル	1000倍	収穫前日迄	1	べと病・うどんこ病・炭そ病	8/19	/	/	/	/	
	ハレート20	2000倍～4000倍	収穫前日迄	3	褐斑病・菌核病	9/22	/	/	/	/	
	スズレト水和剤	1500倍	収穫前日迄	5	褐斑病・菌核病	9/28	/	/	/	/	
	確認印欄	栽培工程管理者					最終確認印欄				
		栽培工程管理責任者									