

330600

JA新みやぎ みどりの地区

宮農センター	小牛田	鹿島台	松山	涌谷	南郷	田尻	電話番号	[REDACTED]		
生産者名	[REDACTED]					生産者コード	[REDACTED]	前回作付品目	さくらもも	
生産者住所	[REDACTED]					播種日	令和 4 年 10 月 20 日			
作付面積	60 坪					定植日	令和 4 年 11 月 9 日			
登録圃場No.						出荷予定期間	令和 5 年 6 月 4 日 ~ 6 月 10 日			

＜土作り日誌＞ 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。

施肥月日	肥料資材名 《土壤分析に基づいた施肥設計》	保証成分 総窒素(有機)ーリン酸ー加里ー苦土ー石灰	肥料10a当り	坪数(△)
			施用量(kg)	施用量(kg)
10月29日	堆肥			500kg
10月29日	苦土カル(タイニー)			30kg
10月29日	苦土重焼燐			12kg
10月29日	燐のカルシウム			30kg
10月29日	コ-ティンク ゼオマメ			30kg

＜防除日誌＞ 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区 分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入				
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
土壌消毒						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
除草剤	クロロIPC乳剤	200ml/10a	中耕培土後 但し 収穫60日前まで	1	一年生雑草	/				
						/	/	/	/	/
殺虫剤	アドマイヤー1粒剤	3kg/10a(2g/植穴)	播種時又は定植時	1	アブラムシ類	11/19				
	スミチオン乳剤	1000倍	収穫3日前迄	3	アブラムシ類	/	/	/		
	アディオン乳剤	3000倍	収穫7日前迄	3	アブラムシ類	3/21	5/7	5/21		
	アドマイヤーフロアブル	4000倍	収穫7日前迄	3	アブラムシ類	/	/	/		
	ダニトロンフロアブル	1000倍	収穫7日前迄	1	チャノホコリダニ・ハダニ類	/				
	モスピラン水溶剤	4000倍	収穫14日前迄	3	アザミウマ類・アブラムシ類	/	/	/		
	マラソン乳剤	1000～3000倍	収穫7日前迄	3	アザミウマ類・カメムシ類	/	/	/		
	アファーム乳剤	2000倍	収穫3日前迄	2	ハモグリバエ類	/	/			
	カスケード乳剤	2000倍	収穫前日迄	3	マメハモグリバエ	/	/	/		
	エルサン乳剤	1000～2000倍	収穫7日前迄	2	アブラムシ類	/	/			
	ガードベイトA	3kg/10a	生育初期	3	ネキリムシ類	11/19	/	/		
						/	/	/	/	/
殺菌・種子粉衣	リドミル水和剤	種子重量0.3%	播種前	1	苗立枯病	/				
						/	/	/	/	/
殺菌剤	ジマンダイセン水和剤	400～600倍	収穫30日前迄	3	さび病・輪紋病	/	/	/		
	アミスター20フロアブル	2000倍	収穫3日前迄	3	さび病	/	/	/		
	セイビアーフロアブル20	1000倍	収穫前日迄	3	灰色かび病	/	/	/		
	ロブラール水和剤	1000倍	収穫前日迄	3	赤色斑点病	3/21	/	/		
	ファンタジスタ顆粒水和剤	2000倍	収穫前日迄	3	赤色斑点病		/			
	カリグリーン	800～1000倍	収穫前日迄	-	さび病	5/7	/	/	/	/
	カンタスドライフロアブル	1000倍	収穫前日迄	3	さび病、赤色斑点病	5/21	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
確認印欄	栽培工程管理者 6/2						最終確認印欄			
	栽培工程管理責任者 8/6									