

栽培暦<品名 小ねぎ >(圃場別・作物別に作成して下さい)

<栽培内容>

(品種名) パワースリム

確認月日: 年 月 日

団体名	JA新みやぎ仙台小ねぎ部会			確認者	
生産者名	[署名]			TEL	83-3600
生産者住所	[住所]			FAX	-
ハウスNO.	19				
播種日	5年 9月26日		定植日	年 月 日	
作付面積	90坪		出荷予定期間	5年 12月 10日 ~ 年 月 日	

<土作り日誌> 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。

月 日	肥料資材名	保証成分	肥料10a当り	坪数(90)
		総窒素(有機)ーリン酸ー加里ー苦土ー石灰	施用量(kg)	施用量(kg)
9/20	エコレット			20
"	LPコート			10
9/15	2人3石灰			200

<防除日誌> 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区 分	使用資材	使用基準			使用薬剤・使用月日を下記に記入					
	薬剤名	希釈倍率または使用量	使用時期	回数	病虫害	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
殺虫剤	ダイアジノン粒剤10%	3kg/10a	播種時	1回	タネバエ					
	カルホス微粒剤	6kg/10a	播種時	1回	ネキリムシ類					
	ベストガード粒剤	6kg/10a	収穫前日迄	3回	ネギハモグリ					
	ダントツ粒剤	3~6kg/10a	収穫3日前迄	4回	アザミウマ・ハモグリバエ					
	スタークル粒剤	6kg/10a	収穫3日前迄	2回	アザミウマ・ハモグリバエ					
	カスケード乳剤	4,000倍	収穫14日前迄	3回	ネギハモグリバエ					
	アフアム乳剤	1,000倍	収穫7日前迄	3回	ネギハモグリバエ					
	マッチ乳剤	2,000倍	収穫7日前迄	3回	シロイチモジヨトウ					
	ハチハチ乳剤	1,000倍	収穫7日前迄	2回	ネギアザミウマ					
	コテツフロアブル	2,000倍	収穫7日前迄	2回	シロイチモジヨトウ					
	リーフガード顆粒水和剤	1,500倍	収穫7日前迄	2回	ネギハモグリバエ					
	プレオフロアブル	1,000倍	収穫3日前迄	4回	ネギアザミウマ					
	スピノエース顆粒水和剤	2,500~5,000倍	収穫3日前迄	3回	アザミウマ類					
	ベネビアOD	2,000倍	収穫前日迄	3回	アザミウマ・ハモグリバエ	10/30				
	72インセープ	2,000倍	収穫3日前迄	2回		11/2				
殺菌剤	モンガリット粒剤	4~6kg/10a	播種時	1回	黒穂病					
	オリゼメート粒剤	6kg/10a	収穫30日前迄	2回	軟腐病					
	リドミルMZ水和剤	1,000倍	収穫30日前迄	3回	べと病					
	ラリー乳剤	4,000倍	収穫14日前迄	3回	さび病					
	アミスター20フロアブル	2,000倍	収穫3日前迄	4回	さび病					
土壌消毒剤	ガスタード微粒剤	20~30kg/10a	播種14日前迄	1回	萎凋病					
確認者	[署名]	[署名]								