

《 品名 小ねぎ 》

<栽培内容>

(品種名) パワー・スリム

JA新みやぎ みどりの地区

営業センター	小牛田 鹿島台 松山 浦河 南郷 田原	電話番号	[REDACTED]		
生産者名	[REDACTED]	生産者コード	[REDACTED]	前回作付品目	142
生産者住所	[REDACTED]	播種日	令和 5 年 3 月 26 日		
作付面積	84 坪	定植日	令和 年 月 日		
登録圃場No.	No. 18	出荷予定期間	令和 5 年 6 月 4 日 ~ 月 日		

＜主作り目録＞ 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。

施肥月日	肥料資材名 《土壌分析に基づいた施肥設計》	保証成分 総窒素(有機)ーリン酸ー加里ー苦土ー石灰	肥料10a当り	坪数(84)
			施用量(kg)	施用量(kg)
3月26日	リール生命			1kg
3月26日	エレクト			20kg
3月26日	LPコート			10kg
月 日				
月 日				

＜防除日誌＞ 使用した農薬をすべてお書き下さい。

区 分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入				
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
土壌消毒	ガスタード微粒剤	20～30kg/10a	播種14日前まで	1	萎凋病	2/1				
						/	/	/	/	/
除草剤						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
殺虫剤	ダイアジノン粒剤10	3kg/10a	播種時	1	クネハエ	/				
	カルボス微粒剤F	6kg/10a	播種時	1	ネキリムシ類	/				
	カスケード乳剤	4000倍	収穫14日前まで	3	ネキ'ハモグリハエ・シロイチモジ'ヨウ	5/17	/	/		
	アファーム乳剤	1000～2000倍	収穫7日前まで	3	ハモグリハエ類・シロイチモジ'ヨウ	/	/	/		
	マツチ乳剤	2000倍	収穫7日前まで	3	シロイチモジ'ヨウ	/	/	/		
	ハチハチ乳剤	1000倍	収穫7日前まで	2	アザ'ミカ類・さび病・べと病	/	/			
	コデツフロアブル	2000倍	収穫7日前まで	2	シロイチモジ'ヨウ・ネキ'ハモグリハエ	/	/			
	リーフガード顆粒水和剤	1500倍	収穫7日前まで	2	ネキ'ハモグリハエ・ネキ'アザ'ミカ	5/10	/			
	ダントツ粒剤	3～6kg/10a	収穫3日前まで	4	ネキ'アザ'ミカ・ネキ'ハモグリ	/	/	/	/	
	スタークル粒剤	6kg/10a	収穫3日前まで	2	アザ'ミカ類・ハモグリハエ類	5/10	/			
	ブレオフロアブル	1000倍	収穫3日前まで	4	ネキ'アザ'ミカ	5/23	/	/	/	
	スピノエース顆粒水和剤	2500～5000倍	収穫3日前まで	3	アザ'ミカ類	/	/	/		
	ベストガード粒剤	6kg/10a	収穫前日まで	3	ネキ'アザ'ミカ・ネキ'ハモグリ	/	/	/		
	ベネビアOD	2000倍	収穫前日まで	3	アザ'ミカ類・ハモグリハエ類	6/1	/	/		
	フィア+	2500倍	収穫前日	2		5/23	/	/	/	/
マライン	1000倍	収穫7日前	6		5/17	/	/	/	/	
殺菌・種子粉衣						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
殺菌剤	モンガリット粒剤	4～6kg/10a	播種時	1	黒穂病	/				
	オリゼメート粒剤	6kg/10a	収穫30日前まで	2	軟腐病	/	/			
	リドミルゴールドMZ	1000倍	収穫30日前まで	3	べと病	/	/	/		
	ラリー水和剤	2000倍	収穫7日前まで	3	さび病	/	/	/		
	アミスター20フロアブル	2000倍	収穫3日前まで	4	さび病・べと病	/	/	/	/	
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
確認 印欄	栽培工程管理者 6/6						最終確認 印欄			
	栽培工程管理責任者 6/6									