

JA新みやぎ みどりの地区

区 分	使用資材	使用基準				使用月日を下記に記入				
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
土壌消毒	ガスタード微粒剤	30kg/10a	播種12日前迄	1	根こぶ病・一年生雑草	/				
						/	/	/	/	/
除草剤	トレスノサイト乳剤	500~333倍	12月迄	1	一年生雑草	10/3	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
殺虫剤	ダイアジノン粒剤5	6kg/10a	播種又は定植時	1	キスジノミハムシ・ケラ・ネキリムシ類	/				
	スタークル粒剤	6kg/10a	播種時	1	アブラムシ類・キスジノミハムシ	/				
	フォース粒剤	4kg/10a	播種時	1	キスジノミハムシ・ネキリムシ類	9/28				
	アドマイヤー1粒剤	3~6kg/10a	播種時	1	アブラムシ類	/				
	アディオン乳剤 2000倍	2000~3000倍	収穫1日前迄	3	ダイコンハムシ・ヤサイノウムシ	10/26	/	/		
	スタークル顆粒水溶剤	2000~3000倍	収穫1日前迄	2	アブラムシ類・キスジノミハムシ	10/20	/			
	アフーム乳剤	1000~2000倍	収穫7日前迄	3	アオムシ・コナガ・ハモグリバエ・ヨトウムシ	/	/	/		
	カスケード乳剤	2000倍	収穫7日前迄	2	アオムシ・コナガ・ハモグリバエ	10/6	10/20			
	モスピラン水溶剤	4000倍	収穫7日前迄	1	アブラムシ類・キスジノミハムシ	10/6				
	アクテリック乳剤	1000倍	収穫7日前迄	1	キスジノミハムシ	/				
	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	収穫3日前迄	1	コナガ	/				
	アドマイヤーフロアブル	4000倍	収穫3日前迄	2	アブラムシ類	/	/	粒剤使用時は1回のみ		
殺菌・種子粉衣						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
殺菌剤	ダコニール1000	1000倍	播種時	1	立枯病	/				
	ネビジン粉剤	20~30kg/10a	播種又は定植時	1	根こぶ病	/				
	リゾレックス粉剤	30kg/10a	播種時	1	尻腐病	/				
	アミスター20フロアブル	2000倍	収穫7日前迄	2	白さび病	/	/			
	ランマンフロアブル	2000倍	収穫3日前迄	3	白さび病	10/20	/	/		
	ヨネボロン水和剤	500倍	14日前迄	4	軟腐病・白さび	10/6	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/
確認印欄	栽培工程管理者 									最終確認印欄
	栽培工程管理責任者 									