

120420

JA新みやぎ みどりの地区

＜栽培内容＞

(品種名)

＜栽培内容＞		(品種名)		6月新選	
営農センター	小牛田 鹿島台 松山 涌谷 (伊南郷) 四原	電話番号	[REDACTED]		
生産者名	[REDACTED]	生産者コード	[REDACTED]	前回作付品目	みず菜・レタス
生産者住所	[REDACTED]	播種日	令和 5 年 4 月 24 日		
作付面積	100坪	定植日	令和 5 年 月 日		
登録圃場No.	A- / B- / C-4 / D-	出荷予定期間	令和 5 年 6 月 5 日 ~ 6 月 7 日		

＜土作り日誌＞ 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。

＜土作り日誌＞ 使用した肥料、その他天然物や土壌改良資材など、すべてお書き下さい。				
施肥月日	肥料資材名 《土壌分析に基づいた施肥設計》	保証成分 総窒素(有機)ーリン酸ー加里ー苦土ー石灰	肥料10a当り	坪数(10b)
			施用量(kg)	施用量(kg)
4月16日	ユ-キノル8-1-4	8-1-4	150	50
月 日				
月 日				
月 日				
月 日				

＜防除日誌＞ 使用した農薬をすべてお書き下さい。

＜防除日誌＞ 使用した農薬をすべてお書き下さい。							使用月日を下記に記入				
区 分	使用資材	使用基準									
	薬剤名	希釈倍率 または使用量	使用時期	回数	病害虫草	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	
土壌消毒	ガスタード微粒剤	30kg/10a	播種12日前迄	1	根こぶ病・一年生雑草	/	/	/	/	/	
						/	/	/	/	/	
除草剤	トレファノサイド粒剤	3kg/10a	播種直後	1	一年生雑草	4/24	/	/	/	/	
						/	/	/	/	/	
殺虫剤	ダイアジノン粒剤5	6kg/10a	播種又は定植時	1	キスジノミハムシ・ケラ・ネキリムシ類	/	/	/	/	/	
	フォース粒剤	4kg/10a	播種時	1	キスジノミハムシ・ネキリムシ類	/	/	/	/	/	
	アドマイヤー1粒剤	3～6kg/10a	播種時	1	アブラムシ類	/	/	/	/	/	
	アディオソ乳剤	3000倍	収穫14日前迄	1	ダイコンハムシ・ヤサイノウムシ	/	/	/	/	/	
	スタークル顆粒水溶剤	2000～3000倍	収穫7日前迄	2	アブラムシ類・キスジノミハムシ	/	/	/	/	/	
	アフーム乳剤	1000～2000倍	収穫7日前迄	3	アオムシ・コナガ・ハモグリバエ・コトウムシ	/	/	/	/	/	
	カスケード乳剤	2000倍	収穫7日前迄	2	アオムシ・コナガ・ハモグリバエ	/	/	/	/	/	
	モスピラン水溶剤	4000倍	収穫7日前迄	1	アブラムシ類・キスジノミハムシ	/	/	/	/	/	
	アクテリック乳剤	1000倍	収穫7日前迄	1	キスジノミハムシ	/	/	/	/	/	
	スピノエース顆粒水和剤	5000倍	収穫3日前迄	1	コナガ	/	/	/	/	/	
	アドマイヤーフロアブル	4000倍	収穫3日前迄	2	アブラムシ類	/	/	粒剤使用時は1回のみ			
	トランスフォームフロアブル	2000倍	収穫前日迄	2	アブラムシ	5/17	6/1	/	/	/	
	アルバリン顆粒水溶剤	2000～3000倍	収穫3日前迄	2	アブラムシ・キスジノミハムシ	5/4	/	/	/	/	
	プロフレアSC	2000～4000倍	収穫前日迄	3	アオムシ・キスジノミハムシ・コナガ	5/11	5/25	/	/	/	
					/	/	/	/	/		
殺菌剤	ダコニール1000	1000倍	播種時	1	立枯病	/	/	/	/	/	
	ネビジン粉剤	20～30kg/10a	播種又は定植時	1	根こぶ病	/	/	/	/	/	
	リソレックス粉剤	30kg/10a	播種時	1	尻腐病	/	/	/	/	/	
	アミスター20フロアブル	2000倍	収穫7日前迄	2	白さび病	/	/	/	/	/	
	ランマンフロアブル	2000倍	収穫3日前迄	3	白さび病	/	/	/	/	/	
	ライメイフロアブル	2000～4000倍	収穫3日前迄	3	白さび病	/	/	/	/	/	
						/	/	/	/	/	
						/	/	/	/	/	
確認印欄	栽培工程管理者					最終確認印欄					
	6/6 										
確認印欄	栽培工程管理責任者					最終確認印欄					
	6/8 										